

Déformation par quantification et rigidité des algèbres enveloppantes

M. Bordemann¹, A. Makhlouf², T. Petit³

Laboratoire de Mathématiques et Applications,
Université de Haute Alsace, Mulhouse

Novembre 2002

Abstract

We call a finite-dimensional complex Lie algebra $\mathfrak{g}$ strongly rigid if its universal enveloping algebra $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ is rigid as an associative algebra, i.e. every formal associative deformation is equivalent to the trivial deformation. In quantum group theory this phenomenon is well-known to be the case for all complex semisimple Lie algebras. We show that a strongly rigid Lie algebra has to be rigid as Lie algebra, and that in addition its second scalar cohomology group has to vanish (which excludes nilpotent Lie algebras of dimension greater or equal than two). Moreover, using Kontsevitch's theory of deformation quantization we show that every polynomial deformation of the linear Poisson structure on $\mathfrak{g}^*$ which induces a nonzero cohomology class of $\mathfrak{g}$ leads to a nontrivial deformation of $\mathcal{U}\mathfrak{g}$. Hence every Poisson structure on a vector space which is zero at some point and whose linear part is a strongly rigid Lie algebra is therefore formally linearizable in the sense of A. Weinstein. Finally we provide examples of rigid Lie algebras which are not strongly rigid, and give a classification of all strongly rigid Lie algebras up to dimension 6.

Mots clés : algèbre enveloppante, déformation, quantification, rigidité, cohomologie, structure de Poisson et linéarisation.

Keywords : enveloping algebra, deformation, quantification, rigidity, cohomology, Poisson structure, linearization.

Classification AMS 2000 : 16S30, 16S80, 17Bxx

¹M.Bordemann@uha.fr

²N.Makhlouf@uha.fr

³T.Petit@uha.fr

Table des matières

1	Introduction	1
2	Généralités	3
3	Algèbres de Lie fortement rigides	9
3.1	L'algèbre de Lie de dimension un	10
3.2	Algèbres de Lie semi-simples	10
3.3	Sommes directes de semi-simples et d'autres	10
3.4	Algèbre de Lie non abélienne de dimension 2	11
3.5	L'algèbre $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^m$	11
4	Propriétés des algèbres de Lie fortement rigides	14
4.1	Rigidité de l'algèbre de Lie	14
4.2	Deuxième groupe de cohomologie scalaire	16
4.3	Quelques contre-exemples	17
5	Quantification par déformation	18
5.1	Star-produits	18
5.2	La formule de Kontsevitch	19
5.3	L'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ à la Kontsevitch	20
6	Déformations des algèbres enveloppantes par quantification	22
6.1	Le théorème	22
6.2	Applications	24
6.2.1	Algèbre de Lie résoluble $\mathfrak{t}_1 \oplus \mathfrak{n}_{5,6}$	24
6.2.2	Produit semi-direct de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ par $\mathfrak{n}_3$	25
6.3	Classification des algèbres fortement rigides de dimension inférieure à six	26
7	Linéarisation des structures de Poisson	26

1 Introduction

Dans la théorie des groupes quantiques de Drinfel'd (voir [17] ou [30]), on considère en particulier les algèbres enveloppantes quantiques $\mathcal{U}_h\mathfrak{g}$ d'une algèbre de Lie $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$ sur un corps $\mathbb{K}$ (généralement algébriquement clos et de caractéristique zéro). Ces algèbres sont des déformations formelles de l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ de $\mathfrak{g}$ en tant qu'algèbre de Hopf. Dans la plupart des exemples, introduits par Drinfel'D [16] et Jimbo [29], $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie semi-simple complexe de dimension finie. Dans ce cas, la déformation formelle de la structure associative de $\mathcal{U}\mathfrak{g}$, au sens de Gerstenhaber [21], dans $\mathcal{U}_h\mathfrak{g}$ (ainsi que pour toute autre déformation associative) est une déformation triviale, c.-à-d. isomorphe à $\mathcal{U}\mathfrak{g}$, (voir par exemple [30, p.430]). En revanche la comultiplication cocommutative de $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ se déforme en une comultiplication non cocommutative dans $\mathcal{U}_h\mathfrak{g}$. Ceci signifie que $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ est une algèbre associative *rigide*, mais non rigide comme algèbre de Hopf. Voir [34] pour les algèbres associatives complexes rigides de dimension finie.

En outre, le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt permet de regarder l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ elle-même comme une 'déformation', en général non commutative, de l'algèbre symétrique $\mathcal{S}\mathfrak{g}$. Cette dernière algèbre est isomorphe à l'algèbre des fonctions polynômiales sur l'espace dual $\mathfrak{g}^*$ de $\mathfrak{g}$ et est munie d'une structure d'algèbre de Poisson (provenant de la structure de Poisson linéaire P_0 sur $\mathfrak{g}^*$ induite par le crochet de Lie de $\mathfrak{g}$). La déformation $\mathcal{S}\mathfrak{g} \rightsquigarrow \mathcal{U}\mathfrak{g}$ a été précisée par Gutt [26] dans la théorie de quantification par déformation de Bayen, Flato, Frønsdal, Lichnerowicz et Sternheimer [3]. Dans cette théorie, on construit des déformations associatives formelles, dites *star-produits* $*$, de l'algèbre $\mathcal{C}^\infty(M)$ de toutes les fonctions à valeurs complexes de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur une variété de Poisson. Kontsevitch a réexaminé cette déformation de $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ dans le cadre d'une formule universelle pour un star-produit sur $\mathbb{R}^n$ muni d'une structure de Poisson arbitraire (voir [32]). L'équivalence de la déformation de Kontsevitch et celle de Gutt à été démontrée par Dito ([13]).

La classification des star-produits à été donnée par Kontsevitch en termes de classes de difféomorphie formelles des structures de Poisson formelles : il s'agit des déformations formelles des structures de Poisson elles-mêmes. En géométrie différentielle, ces déformations ($\mathcal{C}^\infty$ ou formelles) ont été implicitement étudiées dans la théorie de linéarisation des structures de Poisson de Weinstein [42, pp. 537] : on y a surtout étudié le cas où la structure de Poisson s'annule en un point et est linéarisable dans le sens qu'elle est isomorphe à sa partie linéaire. En outre, une formule pour la déformation formelle d'une structure de Poisson de façon que les feuilles symplectiques restent les mêmes a été établie par Lecomte (voir [33, p.165]).

Toutes ces considérations nous ont amenés à poursuivre deux objectifs essentiels dans une partie de [37] et dans cet article :

D’une part, étudier les déformations associatives formelles des algèbres enveloppantes, principalement à l’aide de la déformation de la structure de Poisson linéaire sur $\mathfrak{g}^*$ et de la formule universelle de Kontsevitch.

D’autre part, chercher et caractériser les algèbres de Lie qu’on appelle *fortement rigides*, c.-à-d. dont l’algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ est rigide dans le sens qu’elle n’admet que des déformations triviales comme algèbre associative.

On a obtenu les résultats principaux suivants :

1. A toute déformation polynômiale formelle non triviale de la structure de Poisson linéaire provenant d’une algèbre de Lie complexe $\mathfrak{g}$ on peut associer une déformation non triviale de son algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$, voir le théorème 6.1. Pour le démontrer, on construit d’abord une déformation formelle à deux paramètres de l’algèbre symétrique $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ d’après Kontsevitch et on montre sa convergence par rapport au premier paramètre.
2. Nous avons montré, indépendamment de la théorie de Kontsevitch, les deux cas particuliers importants du théorème 6.1 suivants :
 - Si l’algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ n’est pas rigide, alors $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ n’est pas rigide non plus, voir théorème 4.1. Ceci justifie la notion ‘fortement rigide’ et nous permet d’utiliser les résultats sur la rigidité des algèbres de Lie obtenus par R. Carles, Y. Diakité, M. Goze et J.M. Ancochea-Bermúdez dans ([6],[4], [24], [1]).
 - Si le deuxième groupe de cohomologie scalaire, $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathbb{K})$, de l’algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ ne s’annule pas, alors $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ n’est pas rigide, voir théorème 4.2. Ce critère montre par exemple que les algèbres de Lie nilpotentes de dimension ≥ 2 ne sont pas fortement rigides.
3. En plus des exemples déjà connus comme la classe des algèbres de Lie semi-simples et l’algèbre non abélienne $\mathfrak{r}_2$ de dimension 2, on a établi la forte rigidité des algèbres affines $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^m$ (voir le théorème 3.3). Une preuve plus géométrique à été indépendamment obtenue par Dufour et Zung [19] dans le cadre des structures de Poisson linéarisables. Pour tous ces exemples, nous avons vérifié la nullité du deuxième groupe de cohomologie $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g})$ qui est toujours isomorphe au deuxième groupe de cohomologie de Hochschild $\mathbf{H}_H^2(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g})$ d’après un théorème de H. Cartan et S. Eilenberg.
4. Notre principal théorème 6.1 nous permet d’exclure quelques algèbres de Lie rigides de la liste des fortement rigides, par exemple les sommes semi-directes $\mathfrak{t}_1 \times \mathfrak{n}_{5,6}$ (algèbre de Lie résoluble) et $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \times \mathfrak{n}_3$ (où

$\mathfrak{n}_3$ est l'algèbre de Heisenberg). Ainsi, on classifie les algèbres de Lie fortement rigides jusqu'en dimension 6 :

$$\{0\}, \quad \mathbb{K}, \quad \mathfrak{t}_2, \quad \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}), \quad \mathfrak{gl}(2, \mathbb{K}), \quad \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}) \times \mathfrak{t}_2, \\ \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}) \times \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}), \quad \mathfrak{gl}(2, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^2.$$

5. Du théorème 6.1, on en déduit également que toute structure de Poisson dont la partie linéaire correspond à une algèbre fortement rigide est formellement linéarisable.

Dans cet article, on consacre le deuxième paragraphe aux rappels de quelques généralités concernant les algèbres enveloppantes, la théorie des déformations, la cohomologie, la rigidité et les structures de Poisson. Dans le paragraphe 3, on définit les algèbres de Lie fortement rigides, et on trouve les exemples mentionnés ci-dessus par un calcul cohomologique. Le paragraphe 4 est consacré aux propriétés des algèbres de Lie fortement rigides, notamment à la démonstration du théorème 4.1 et 4.2 mentionnés ci-dessus. Dans le paragraphe 5, on rappelle la théorie de la quantification par déformation et la formule universelle de Kontsevitch pour une déformation de $\mathcal{C}^\infty(M)$ pour toute variété de Poisson M . Après avoir rappelé la construction de Gutt et de Dito, on démontre notre théorème principal 6.1 mentionné ci-dessus. Dans le paragraphe 6, on donne la classification des algèbres de Lie fortement rigides de dimension inférieure ou égale à six. On en déduit également quelques remarques à propos du problème de linéarisation des structures de Poisson en paragraphe 7.

Remerciements

Nous remercions Aleksei Bolsinov, Roger Carles, Jean-Paul Dufour, Michel Goze et Freddy Van Oystaeyen pour les fructueuses discussions et propositions.

2 Généralités

1. Soient K un anneau commutatif unitaire et $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie sur K . Rappelons qu'une $\mathfrak{g}$ -représentation (à gauche) de $\mathfrak{g}$ est un K -module $\mathcal{M}$ et un K -homomorphisme

$$\mathfrak{g} \otimes_K \mathcal{M} \mapsto \mathcal{M} : x \otimes a \mapsto xa \quad (2.1)$$

tel que $x(ya) - y(xa) = [x, y]a$. À toute algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, on associe une K -algèbre associative $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ telle que toute $\mathfrak{g}$ -représentation (à gauche) peut être vue comme une $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ -représentation (à gauche) et vice-versa. L'algèbre $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ est construite de la manière suivante :

Soit $T\mathfrak{g}$ l'algèbre tensorielle du K -module $\mathfrak{g}$, $T\mathfrak{g} = T^0 \oplus T^1 \oplus \cdots \oplus T^n \oplus \cdots$ où $T^n = \mathfrak{g} \otimes_K \mathfrak{g} \otimes_K \cdots \otimes_K \mathfrak{g}$ (n fois), en particulier $T^0 = K1$ et $T^1 = \mathfrak{g}$. Le produit dans $T\mathfrak{g}$ étant la multiplication tensorielle. Toute application K -linéaire $\mathfrak{g} \otimes_K \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ admet une extension unique en un morphisme de K -algèbres $T\mathfrak{g} \rightarrow \mathbf{Hom}_K(\mathcal{M}, \mathcal{M})$. Pour que la restriction de ce morphisme à $\mathfrak{g}$ définisse une $\mathfrak{g}$ -représentation sur $\mathcal{M}$, il est nécessaire et suffisant que les éléments de $T\mathfrak{g}$ de la forme $x \otimes y - y \otimes x - [x, y]$ où $x, y \in \mathfrak{g}$ annulent $\mathcal{M}$. Par conséquent, on introduit l'idéal bilatère $\mathcal{I}$ engendré par les éléments $x \otimes y - y \otimes x - [x, y]$ où $x, y \in \mathfrak{g}$, et on définit l'algèbre enveloppante de $\mathfrak{g}$ comme le quotient $T\mathfrak{g}/\mathcal{I}$. On identifie ainsi les $\mathfrak{g}$ -représentations et les $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ -modules. Rappelons que tout $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ -bimodule $\mathcal{M}$ est un $\mathfrak{g}$ -module par $(x, m) \rightarrow xm - mx$, noté $\mathcal{M}_a$.

Supposons que l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ soit un K -module libre, soit $\{x_i\}$ une base fixée de $\mathfrak{g}$. Soit y_i l'image de x_i par le K -homomorphisme $\mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{U}\mathfrak{g}$. On pose $y_I = y_{i_1} \cdots y_{i_p}$ avec I une suite finie d'indices $1 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_p$ et $y_I = 1$ si $I = \emptyset$. D'après le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt, l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ est engendrée par les éléments y_I correspondant à des suites croissantes I (voir par exemple [7, pp. 271]).

Soit $K = \mathbb{K}$ un corps. On désigne par $\mathcal{S}V$ l'algèbre symétrique sur le $\mathbb{K}$ -module V . Si $\mathbb{Q} \in \mathbb{K}$, il existe une bijection canonique $\omega : \mathcal{S}\mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{U}\mathfrak{g}$ donnée par

$$\omega(x_1 \cdots x_n) := \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(n)} \quad (2.2)$$

(où $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{g}$ et S_n est le groupe des permutations de $\{1, \dots, n\}$) qui est un isomorphisme de $\mathfrak{g}$ -modules entre $\mathcal{S}\mathfrak{g}_a$ et $\mathcal{U}\mathfrak{g}_a$ (voir par exemple [15, pp.78-79]).

2. Les premiers travaux sur les déformations des algèbres remontent aux années 60. L'article de M. Gerstenhaber [21] fournit l'outil de ces déformations sur la base des séries formelles qu'on rappelle ci-dessous. Désormais $\mathbb{K}$ désigne un corps algébriquement clos de caractéristique nulle. Soit $\mathbb{K}[[t]]$ l'anneau des séries formelles à coefficients dans $\mathbb{K}$. Pour chaque $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E on note $E[[t]]$ le $\mathbb{K}[[t]]$ -module de toutes les séries formelles à coefficients dans E . Soit $(\mathcal{A}, \mu_0)$ une $\mathbb{K}$ -algèbre associative (resp. de Lie). Alors $(\mathcal{A}[[t]], \mu_0)$ est une $\mathbb{K}[[t]]$ -algèbre associative (resp. de Lie).

Définition 2.1 (a) On appelle déformation associative (resp. d'une algèbre de Lie) formelle de $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}[[t]]$ -algèbre associative (resp.

de Lie) $(\mathcal{A}[[t]], \mu_t)$ avec

$$\mu_t = \mu_0 + t\mu_1 + t^2\mu_2 + \cdots + t^n\mu_n + \cdots,$$

où $\mu_n \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathcal{A} \otimes_{\mathbb{K}} \mathcal{A}, \mathcal{A})$. (resp. $\mu_n \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathcal{A} \wedge_{\mathbb{K}} \mathcal{A}, \mathcal{A})$).

(b) Deux déformations $(\mathcal{A}[[t]], \mu_t)$ et $(\mathcal{A}[[t]], \mu'_t)$ sont dites équivalentes s'il existe un isomorphisme formel

$$\varphi_t = \varphi_0 + \varphi_1 t + \cdots + \varphi_n t^n + \cdots,$$

avec $\varphi_0 = Id_{\mathcal{A}}$ (l'application identité de $\mathcal{A}$) et $\varphi_n \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ tel que

$$\mu'_t(a, b) = \varphi_t^{-1}(\mu_t(\varphi_t(a), \varphi_t(b))) \quad \forall a, b \in \mathcal{A}.$$

(c) Une déformation de $\mathcal{A}$ est dite triviale si elle est équivalente à $(\mathcal{A}[[t]], \mu_0)$.

(d) Une algèbre associative (resp. de Lie) $\mathcal{A}$ est dite rigide si toute déformation de $\mathcal{A}$ est triviale.

3. La théorie des déformations est intimement liée à la cohomologie de Hochschild dans le cas des algèbres associatives et à la cohomologie de Chevalley-Eilenberg dans le cas des algèbres de Lie. On désigne par $\mathbf{H}_H^n(\mathcal{A}, \mathcal{M})$ le n -ième groupe de cohomologie de Hochschild d'une algèbre associative $\mathcal{A}$ à valeurs dans un bimodule $\mathcal{M}$ et par $\mathbf{H}_{CE}^n(\mathfrak{g}, \mathcal{M})$ le n -ième groupe de cohomologie de Chevalley-Eilenberg d'une algèbre de Lie $\mathcal{A}$ à valeurs dans un $\mathfrak{g}$ -module $\mathcal{M}$. Le deuxième groupe de cohomologie de Hochschild d'une algèbre associative (resp. cohomologie de Chevalley-Eilenberg d'une algèbre de Lie) à valeurs dans l'algèbre correspond à l'espace des déformations infinitésimales. Pour notre étude, le fait suivant sera très important (voir [21], [22] et [36]) :

Proposition 2.1 Soit $\mathcal{A}$ (resp. $\mathfrak{g}$) une algèbre associative (resp. une algèbre de Lie).

(a) Si le deuxième groupe de cohomologie de Hochschild, $\mathbf{H}_H^2(\mathcal{A}, \mathcal{A})$, (resp. de Chevalley-Eilenberg, $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})$), s'annule, alors l'algèbre $\mathcal{A}$ (resp. $\mathfrak{g}$) est rigide.

(b) D'un autre côté, si $\mu_0 + t\mu_1 + \dots$ est une déformation de $\mathcal{A}$ (resp. de $\mathfrak{g}$) et si $\mathcal{A}$ (resp. $\mathfrak{g}$) est rigide, alors le 2-cocycle μ_1 est toujours un 2-cobord de la cohomologie de Hochschild (resp. de Chevalley-Eilenberg).

(voir [30, p.430] pour une démonstration). La réciproque de l'assertion (a) est fausse, il existe des exemples d'algèbres de Lie rigides dont le

deuxième groupe de cohomologie est non nul (voir [40]. Le problème est encore ouvert en caractéristique 0 pour les algèbres associatives (voir [23] pour un exemple en caractéristique p)

Le troisième groupe de cohomologie quand à lui correspond à l'espace des obstructions pour l'extension d'ordre n à une déformation d'ordre $n + 1$ ([21], [22] et [36]).

4. Le théorème classique suivant dû à H. Cartan et S. Eilenberg ([7, pp.277]) fait le lien entre la cohomologie de Hochschild de l'algèbre enveloppante à valeurs dans un $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ -bimodule $\mathcal{M}$ (en particulier $\mathcal{M} = \mathcal{U}\mathfrak{g}$) et la cohomologie de Chevalley-Eilenberg de l'algèbre de Lie à valeurs dans le même module.

Théorème 2.1 *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie de dimension finie sur $\mathbb{K}$. Alors*

$$\mathbf{H}_H^n(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{M}) \simeq \mathbf{H}_{CE}^n(\mathfrak{g}, \mathcal{M}_a) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

En particulier, si $\mathbb{Q} \subset \mathbb{K}$ on a pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbf{H}_H^n(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g}) \simeq \mathbf{H}_{CE}^n(\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g}_a) \simeq \mathbf{H}_{CE}^n(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g}_a) \simeq \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathbf{H}_{CE}^n(\mathfrak{g}, \mathcal{S}^k \mathfrak{g}_a)$$

5. Le théorème de Hochschild et Serre ([28]) suivant fournit une factorisation des groupes de cohomologie de Chevalley-Eilenberg :

Théorème 2.2 *Soient $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie de dimension finie, $\mathcal{M}$ un $\mathfrak{g}$ -module de dimension finie sur $\mathbb{K}$, $\mathfrak{n}$ un idéal de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{b}$ une sous-algèbre supplémentaire de $\mathfrak{n}$, réductive dans $\mathfrak{g}$, telle que le $\mathfrak{b}$ -module induit sur $\mathcal{M}$ soit semi-simple, alors pour tout entier positif p on a*

$$\mathbf{H}_{CE}^p(\mathfrak{g}, \mathcal{M}) \simeq \sum_{i+j=p} \mathbf{H}_{CE}^i(\mathfrak{b}, \mathbb{K}) \otimes \mathbf{H}_{CE}^j(\mathfrak{n}, \mathcal{M})^{\mathfrak{b}}.$$

où $\mathbf{H}_{CE}^j(\mathfrak{n}, \mathcal{M})^{\mathfrak{b}}$ désigne le sous-espace de tous les éléments invariants par $\mathfrak{b}$.

6. Une *algèbre de Poisson* est une algèbre associative commutative $\mathcal{A}$ sur $\mathbb{K}$ munie d'une application bilinéaire $\{ , \} : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ vérifiant pour tout $f, g, h \in \mathcal{A}$

$$\{f, g\} = -\{g, f\} \tag{2.3}$$

$$0 = \{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} \tag{2.4}$$

(identité de Jacobi)

$$\{h, fg\} = \{h, f\}g + f\{h, g\} \tag{2.5}$$

(identité de Leibniz)

On note par $(\mathcal{A}, \cdot, \{ , \})$ une telle algèbre. Une variété M est dite *variété de Poisson* si l'algèbre des fonctions $\mathcal{C}^\infty(M)$ est munie d'une structure de Poisson.

7. Soit M une variété de Poisson. Pour tout $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, l'application linéaire $\{f, \cdot\} : \mathcal{C}^\infty(M) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(M)$ définit une dérivation. Soit X_f le champ de vecteurs associé à f , le crochet de Poisson s'écrit alors

$$\{f, g\} = X_f g = -X_g f = dg(X_f) = -df(X_g)$$

Il s'ensuit que le crochet de Poisson est déterminé par une application bilinéaire antisymétrique sur le fibré cotangent T^*M de M , c'est à dire un champ de tenseurs antisymétriques $P \in \Gamma^\infty(M, \Lambda^2 TM)$ (avec TM le fibré tangent de M) tel que

$$\{f, g\} = P(df, dg) = \sum_{i,j} P^{ij} \partial_i f \partial_j g \quad (2.6)$$

avec ∂_i ($1 \leq i \leq n$) la dérivation $\frac{\partial}{\partial x^i}$ où $(x^1, \dots, x^n)$ sont des coordonnées locales sur M et P^{ij} sont des fonctions locales $\mathcal{C}^\infty$ définies par $P^{ij} := \{x^i, x^j\}$. Le champ de tenseurs P est appelé *bivecteur de Poisson*.

Toute structure de Poisson sur M est équivalente à la donnée d'un bivecteur $P \in \Gamma^\infty(M, \Lambda^2 TM)$ vérifiant, dans toute carte,

$$\sum_{h=1}^n (P^{ih} \partial_h P^{jk} + P^{jh} \partial_h P^{ki} + P^{kh} \partial_h P^{ij}) = 0. \quad (2.7)$$

8. Soient M une variété différentiable, $\mathcal{T}^i M := \Gamma^\infty(M, \Lambda^i TM)$ l'espace des champs de tenseurs antisymétriques de degré $i \in \mathbb{N}$, $\mathcal{T}^0 M := \mathcal{C}^\infty(M)$ et $\mathcal{T}M = (\oplus_{n \geq 0} \mathcal{T}^n M, \wedge)$ l'algèbre des multivecteurs sur M . Pour tout $X, Y_1, \dots, Y_p \in \mathcal{T}^1 M$ l'opérateur dérivée de Lie associé est défini par

$$[X, Y_1 \wedge \dots \wedge Y_p] = \sum_{i=1}^p Y_1 \wedge \dots \wedge [X, Y_i] \wedge \dots \wedge Y_p \quad (2.8)$$

On définit pour $X_1, \dots, X_p \in \mathcal{T}^1 M$ et $Q \in \mathcal{T}M$ une extension de la dérivée de Lie, appelée *crochet de Schouten*, définie par :

$$[X_1 \wedge \dots \wedge X_p, Q]_s = \sum_{i=1}^p (-1)^{i+1} X_1 \wedge \dots \wedge \widehat{X_i} \wedge \dots \wedge X_p \wedge [X_i, Q] \quad (2.9)$$

avec $\widehat{X_i}$ signifiant que X_i est omis.

Le crochet de Schouten $[\cdot, \cdot]_s : \mathcal{T}^p M \times \mathcal{T}^q M \rightarrow \mathcal{T}^{p+q-1} M$ vérifie les propriétés suivantes :

$$[P, Q]_s = -(-1)^{(p-1)(q-1)}[Q, P]_s \quad (2.10)$$

$$[P, Q \wedge R]_s = [P, Q]_s \wedge R + (-1)^{pq+q} Q \wedge [P, R]_s \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} 0 &= (-1)^{(p-1)(r-1)}[P, [Q, R]_s]_s + (-1)^{(q-1)(p-1)}[Q, [R, P]_s]_s \\ &\quad + (-1)^{(r-1)(q-1)}[R, [P, Q]_s]_s \end{aligned} \quad (2.12)$$

L'algèbre des multivecteurs $\mathcal{T}M$ munie du crochet de Schouten est une super-algèbre de Lie. En particulier, on a les formules suivantes en coordonnées locales :

- (a) Soient $P = \frac{1}{2} \sum_{i,j} P^{ij} \partial_i \wedge \partial_j \in \mathcal{T}^2 M$ et $Q = \frac{1}{2} \sum_{i,j} Q^{ij} \partial_i \wedge \partial_j \in \mathcal{T}^2 M$. Il vient :

$$\begin{aligned} [P, Q]_s &= \sum_{i,j,k,h} (P^{ih} \partial_h Q^{jk} + P^{kh} \partial_h Q^{ij} + P^{jh} \partial_h Q^{ki} \\ &\quad + Q^{ih} \partial_h P^{jk} + Q^{kh} \partial_h P^{ij} + Q^{jh} \partial_h P^{ki}) \partial_i \wedge \partial_j \wedge \partial_k \end{aligned} \quad (2.13)$$

- (b) Soient $P = \frac{1}{2} \sum_{i,j} P^{ij} \partial_i \wedge \partial_j \in \mathcal{T}^2 M$ un champ de bivecteurs et $A = \sum_i A^i \partial_i \in \mathcal{T}^1 M$ un champ de vecteurs. Il vient :

$$[P, A]_s = \sum_{i,j,k} (P^{ik} \partial_k A^j + P^{kj} \partial_k A^i - P^{ij} \partial_k A^k) \partial_i \wedge \partial_j \quad (2.14)$$

Un bivecteur $P \in \mathcal{T}^2 M$ définit une structure de Poisson si et seulement si le crochet de Schouten $[P, P]_s = 0$. Il s'ensuit que l'opérateur $\delta_P := [P, \cdot]_s$ est de carré nul et détermine la structure d'un complexe sur $\mathcal{T}M$ dont la cohomologie est appelée *cohomologie de Poisson*.

Soit $P_t := \sum_{a=0}^{\infty} t^a P_a$ une série formelle de champs de bivecteurs, c.-à-d. $P_a \in \mathcal{T}^2 M$ quel que soit $a \in \mathbb{N}$. P_t est dite *structure de Poisson formelle sur M* lorsque $[P_t, P_t]_s = 0$ ce qui est équivalent à

$$\sum_{\substack{b,c \geq 0 \\ b+c=a}} [P_b, P_c]_s = 0 \quad \forall a \in \mathbb{N} \quad (2.15)$$

En particulier, $[P_0, P_0]_s = 0$, alors P_0 est une structure de Poisson sur M . La série P_t est dite *déformation formelle de la structure de Poisson P_0* . Pour $a = 1$, l'équation (2.15) donne $0 = [P_0, P_1]_s$, donc le champ de bivecteurs P_1 est toujours un cocycle de la cohomologie de Poisson.

9. Soit $(\mathfrak{g}, [\ , \])$ une algèbre de Lie de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$ et $\mathfrak{g}^*$ son dual algébrique. L'algèbre symétrique $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ s'identifie de manière naturelle à l'algèbre des fonctions polynômiales sur $\mathfrak{g}^*$. La structure de $\mathfrak{g}$ permet de définir un crochet de Poisson linéaire sur $\mathfrak{g}^*$:

$$\{f, g\}(x) := x([df(x), dg(x)])$$

avec $f, g \in \mathcal{S}\mathfrak{g}$ et $x \in \mathfrak{g}^*$. Soient $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ une base de $\mathfrak{g}$, $(e^i)_{i=1, \dots, n}$ sa base duale et $x = \sum_{i=1}^n x_i e^i \in \mathfrak{g}^*$, $\{f, g\} = P_0(df, dg)$ avec P_0 le bivecteur défini par

$$P_0 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} P_0^{ij} \partial_i \wedge \partial_j \quad \text{où} \quad P_0^{ij}(x) = \sum_k C_{ij}^k x_k \quad (2.16)$$

avec C_{ij}^k les constantes de structure de $\mathfrak{g}$.

Il s'ensuit que $(\mathcal{S}\mathfrak{g}, \cdot, \{ \ , \ })$ est une algèbre de Poisson.

10. Toute cochaîne de Chevalley-Eilenberg dans $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^k \mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g})$ s'identifie de façon naturelle à un champ de multivecteurs dans $\mathcal{T}^k(\mathfrak{g}^*)$. Les deux formules suivantes qui se déduisent par un calcul direct caractérisent la liaison entre l'opérateur cobord δ_{CE} de la cohomologie de Chevalley-Eilenberg et celui de la structure de Poisson linéaire.

Lemme 2.1 *Soit $\phi \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^k \mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g}) \cong \Lambda^k \mathfrak{g}^* \otimes \mathcal{S}\mathfrak{g} \subset \mathcal{T}^k(\mathfrak{g}^*)$ et soit $i(e_i) : \Lambda^\bullet \mathfrak{g} \rightarrow \Lambda^{\bullet-1} \mathfrak{g}$ le produit intérieur.*

$$\delta_{CE}\phi(x) = \sum_{i,j,k} C_{ik}^j x_j e^i \wedge \frac{\partial}{\partial x_k} \phi(x) - \frac{1}{2} \sum_{i,k,l} C_{kl}^i e^k \wedge e^l \wedge i(e_i)(\phi(x)) \quad (2.17)$$

$$\delta_{CE}\phi = [P_0, \phi]_s \quad (2.18)$$

3 Algèbres de Lie fortement rigides

Dans ce paragraphe on introduit la notion de forte rigidité avec quelques exemples.

Définition 3.1 *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est dite fortement rigide si son algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ est rigide comme algèbre associative.*

Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est dite infinitésimalement fortement rigide si le deuxième groupe de cohomologie $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g})$ s'annule.

La proposition suivante est une conséquence immédiate de la proposition 2.1 et du théorème de Cartan-Eilenberg (2.1) :

Proposition 3.1 *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie de dimension finie. Si $\mathfrak{g}$ est infinitésimalement fortement rigide, alors elle est fortement rigide.*

Tous les exemples qui suivent correspondent à des algèbre de Lie infinitésimalement fortement rigides. On calcule le deuxième groupe de cohomologie $H_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g})$ à l'aide du théorème de Hochschild-Serre (2.2) appliqué à tous les groupes $H_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}^k \mathfrak{g})$.

3.1 L'algèbre de Lie de dimension un

Evidemment, $H_{CE}^2(\mathbb{K}, \mathcal{S}^k \mathbb{K}) = \{0\}$, alors

Proposition 3.2 *L'algèbre de Lie de dimension 1 est infinitésimalement fortement rigide.*

3.2 Algèbres de Lie semi-simples

D'après les lemmes de Whitehead, le premier et le deuxième groupe de cohomologie d'une algèbre de Lie semi-simple $\mathfrak{g}$ à valeurs dans tout $\mathbb{K}$ -module de dimension finie sont triviaux. Par conséquent, $H_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}^k \mathfrak{g}) = \{0\}$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Ceci assure, pour le cas particulier $k = 1$, la rigidité de l'algèbre de Lie. D'après ce qui précède on a le théorème classique (voir [30, p. 426]) :

Théorème 3.1 *Toute algèbre de Lie semisimple de dimension finie est infinitésimalement fortement rigide.*

3.3 Sommes directes de semi-simples et d'autres

Théorème 3.2 *Soit $\mathfrak{f}$ une algèbre de Lie de dimension finie qui est infinitésimalement fortement rigide et $\mathfrak{s}$ une algèbre de Lie semi-simple de dimension finie.*

Alors la somme directe $\mathfrak{g} := \mathfrak{f} \oplus \mathfrak{s}$ est infinitésimalement fortement rigide.

Démonstration: D'après le théorème de Hochschild-Serre (2.2) et les lemmes de Whitehead on a

$$H_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g}) \cong H_{CE}^2(\mathfrak{f}, \mathcal{S}\mathfrak{g}_a)^{\mathfrak{s}} \cong H_{CE}^2(\mathfrak{f}, \mathcal{S}\mathfrak{f} \otimes \mathcal{S}\mathfrak{s})^{\mathfrak{s}} \cong H_{CE}^2(\mathfrak{f}, \mathcal{S}\mathfrak{f}_a) \otimes (\mathcal{S}\mathfrak{s})^{\mathfrak{s}} \cong \{0\}$$

et $\mathfrak{g}$ est infinitésimalement fortement rigide. □

En particulier :

Corollaire 3.1 *La somme directe d'une algèbre de Lie semi-simple $\mathfrak{s}$ de dimension finie et de l'algèbre de Lie de dimension 1 est infinitésimalement fortement rigide.*

Par exemple, l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{K})$ est infinitésimalement fortement rigide quel que soit $m \in \mathbb{N}$.

3.4 Algèbre de Lie non abélienne de dimension 2

On désigne par $\mathfrak{r}_2$ l'algèbre de Lie résoluble engendrée par X, Y tel que

$$[X, Y] = Y.$$

Celle-ci est l'algèbre de Lie du groupe affine de la droite.

Proposition 3.3 *L'algèbre de Lie $\mathfrak{r}_2$ est infinitésimalement fortement rigide.*

Démonstration: Posons, $\mathfrak{r}_2 = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}$ où $\mathfrak{t} := \mathbb{K}X$ est une sous-algèbre réductive et $\mathfrak{n} := \mathbb{K}Y$ est le nilradical de $\mathfrak{r}_2$. Puisque $\mathfrak{t}$ et $\mathfrak{n}$ sont de dimension 1, il vient que

$$\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{r}_2) = \{0\}, \quad \mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{t}, \mathbb{K}) = \{0\}, \quad \mathbf{H}_{CE}^1(\mathfrak{t}, \mathbb{K}) = \mathbb{K},$$

et le théorème de Hochschild-Serre entraîne que

$$\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{r}_2, \mathcal{S}\mathfrak{r}_2) \simeq \mathbf{H}_{CE}^1(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{r}_2)^{\mathfrak{t}}. \quad (3.1)$$

Il est clair que l'espace des 1-cocycles $\mathbf{Z}_{CE}^1(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{r}_2)$ est égal à $\mathbf{C}_{CE}^1(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{r}_2)$, l'espace des 1-cochaînes. Soit F une telle 1-cochaîne et soit $f := F(Y) \in \mathcal{S}\mathfrak{r}_2$. F est $\mathfrak{t}$ -invariante si $0 = X.(F(Y)) - F([X, Y]) = X.f - f$. Il existe un unique polynôme $\phi \in \mathbb{K}[X, Y]$ tel que $f = \phi(X, Y)$. Puisque $X.f = Y \frac{\partial \phi(X, Y)}{\partial Y}$, l'invariance de F entraîne que $\phi(X, Y) = \chi(X)Y$ pour un polynôme $\chi \in \mathbb{K}[X]$.

D'un autre côté, soit $G = \psi(X, Y) \in \mathcal{S}\mathfrak{r}_2 = \mathbf{C}_{CE}^0(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{r}_2)$ où $\psi \in \mathbb{K}[X, Y]$. G est invariant par $\mathfrak{t}$ si et seulement si $0 = X.G = Y \frac{\partial \psi(X, Y)}{\partial Y}$, c'est à dire, si et seulement si $\psi(X, Y) = \eta(X)$ pour un polynôme $\eta \in \mathbb{K}[X]$. Alors $(\delta_{CE}G)(Y) = Y.G = -Y \frac{\partial \eta(X)}{\partial X}$.

Il est évident que pour chaque polynôme $\chi \in \mathbb{K}[X]$, il existe une primitive $\eta \in \mathbb{K}[X]$ telle que $-\frac{\partial \eta(X)}{\partial X} = \chi(X)$. Il s'ensuit que le groupe de cohomologie $\mathbf{H}_{CE}^1(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{r}_2)^{\mathfrak{t}}$ s'annule, donc $\mathfrak{r}_2$ est infinitésimalement fortement rigide. $\square$

A l'aide du théorème 3.2 on obtient :

Corollaire 3.2 *La somme directe de $\mathfrak{r}_2$ et d'une algèbre de Lie semisimple de dimension finie $\mathfrak{s}$ est infinitésimalement fortement rigide.*

3.5 L'algèbre $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^m$

Soit m un entier strictement positif, $\mathfrak{a}$ l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{K})$, $\mathfrak{n}$ l'espace vectoriel $\mathbb{K}^m$ et $\mathfrak{g}$ la somme semi-directe $\mathfrak{a} \ltimes \mathfrak{n}$ (où le crochet est défini par $[\phi + v, \phi' + v'] := [\phi, \phi'] + \phi v' - \phi' v$). On a le théorème suivant qui généralise l'exemple précédent $\mathfrak{r}_2 = \mathfrak{gl}(1, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^1$:

Théorème 3.3 *Avec les définitions mentionnées ci-dessus on a*

$$\mathbf{H}_{CE}^0(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{a}} \cong \mathbb{K} \quad \text{et} \quad \mathbf{H}_{CE}^k(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{a}} \cong \{0\} \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1.$$

Il s'ensuit que

$$\mathbf{H}_{CE}^k(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g}) \cong \mathbf{H}_{CE}^k(\mathfrak{a}, \mathbb{K}).$$

En particulier, $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g}) \cong \{0\}$, donc $\mathfrak{g}$ est infinitésimalement fortement rigide.

Démonstration: Puisque $\mathfrak{a}$ est une sous-algèbre réductive dans $\mathfrak{g}$, le théorème de Hochschild-Serre 2.2 s'applique et donne la décomposition

$$\mathbf{H}_{CE}^k(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g}) \cong \bigoplus_{r=0}^k \mathbf{H}_{CE}^{k-r}(\mathfrak{a}, \mathbb{K}) \otimes_{\mathbb{K}} \mathbf{H}_{CE}^r(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{a}}.$$

Pour calculer les groupes de cohomologie $\mathbf{H}_{CE}^r(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{a}}$ il faut considérer les espaces des r -cochaînes $\mathfrak{a}$ -invariantes, $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{a}}$. Evidemment, $\mathcal{S}\mathfrak{g} \cong \mathcal{S}\mathfrak{a} \otimes_{\mathbb{K}} \mathcal{S}\mathfrak{n}$, et on a $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^l \mathfrak{g}) = \bigoplus_{i=0}^l \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^i \mathfrak{a} \otimes_{\mathbb{K}} \mathcal{S}^{l-i} \mathfrak{n})$. Puisque $\mathfrak{a} = \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}, \mathfrak{n})$, alors $\mathcal{S}^i \mathfrak{a} \subset \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}, \mathfrak{n})^{\otimes i} = \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes i}, \mathfrak{n}^{\otimes i})$, donc

$$\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^i \mathfrak{a} \otimes_{\mathbb{K}} \mathcal{S}^{l-i} \mathfrak{n})^{\mathfrak{a}} \subset \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes(i+r)}, \mathfrak{n}^{\otimes(i+l-i)})^{\mathfrak{a}}.$$

Soit $f \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes(i+r)}, \mathfrak{n}^{\otimes l})^{\mathfrak{a}} \cong (\mathfrak{n}^{\otimes l} \otimes_{\mathbb{K}} \mathfrak{n}^{*\otimes(i+r)})^{\mathfrak{a}}$. En particulier, f est invariant par l'application identité $\mathbf{1} \in \mathfrak{a}$. Puisque $\mathbf{1}.g = lg$ pour tout $g \in \mathfrak{n}^{\otimes l}$ et $\mathbf{1}.h = -(r+i)h$ pour tout $h \in \mathfrak{n}^{*\otimes(r+i)}$, alors f ne peut être non nul que si $r+i = l$, donc $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^l \mathfrak{g})^{\mathfrak{a}} = \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^{l-r} \mathfrak{a} \otimes \mathcal{S}^r \mathfrak{n})^{\mathfrak{a}}$. Puisque l'algèbre commutative $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ s'identifie de façon naturelle à l'algèbre des polynômes sur l'espace dual $\mathfrak{a}^* \times \mathfrak{n}^*$, alors l'application linéaire Φ_r^l suivante est une surjection $\mathfrak{a}$ -équivariante :

$$\begin{aligned} \Phi_r^l : \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes l}, \mathfrak{n}^{\otimes l}) &\rightarrow \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^{l-r} \mathfrak{a} \otimes \mathcal{S}^r \mathfrak{n}) : \\ \psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_l &\mapsto \left((\phi, \alpha) \mapsto (v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \mapsto \text{trace}(\psi_1 \phi) \cdots \text{trace}(\psi_{l-r} \phi) \right. \\ &\quad \left. \langle (\alpha \psi_{l-r+1}) \wedge \cdots \wedge (\alpha \psi_l), v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \rangle) \right) \end{aligned}$$

où on a utilisé $\mathfrak{a}^* \cong \mathfrak{a}$, et $\phi, \psi_1, \dots, \psi_l \in \mathfrak{a}$, $\alpha \in \mathfrak{n}^*$ et $v_1, \dots, v_r \in \mathfrak{n}$. Grâce à l'équivariance de Φ_r^l il vient que l'espace $\Phi_r^l(\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes l}, \mathfrak{n}^{\otimes l})^{\mathfrak{a}})$ est égal à l'espace $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^{l-r} \mathfrak{a} \otimes \mathcal{S}^r \mathfrak{n})^{\mathfrak{a}}$.

L'espace des $\mathfrak{a}$ -invariants, $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes l}, \mathfrak{n}^{\otimes l})^{\mathfrak{a}}$ est déterminé par le théorème classique de H. Weyl (voir par exemple [12, p.29] pour le cas d'un corps algébriquement clos ou [31, p.214] pour le cas d'un corps ordonné suivant un raisonnement de G.B.Gurevich, 1948) : soit S_l le groupe symétrique d'ordre l , et pour une permutation $\sigma \in S_l$ soit $\hat{\sigma}$ l'élément de $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes l}, \mathfrak{n}^{\otimes l})$ défini par

$$\hat{\sigma}(w_1 \otimes \cdots \otimes w_l) := w_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes w_{\sigma(l)}.$$

Alors d'après le théorème de H. Weyl

$$\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathfrak{n}^{\otimes l}, \mathfrak{n}^{\otimes l})^{\mathfrak{a}} = \{ \sum_{\sigma \in S_l} a_{\sigma} \hat{\sigma} \mid a_{\sigma} \in \mathbb{K} \}.$$

Soit $e_1, \dots, e_m$ une base de $\mathfrak{n}$ et $e^1, \dots, e^m$ la base duale. Alors les éléments $E_j^i \in \mathfrak{a}$ définis par $E_j^i(e_k) := \delta_k^i e_j$ forment une base de $\mathfrak{a}$. Soit $\sigma \in S_l$, alors on voit sans peine que $\hat{\sigma} = \sum_{i_1, \dots, i_l=1}^m E_{i_{\sigma(1)}}^{i_1} \otimes \dots \otimes E_{i_{\sigma(l)}}^{i_l}$, alors pour $\phi = \sum_{i,j=1}^m \phi_j^i E_i^j \in \mathfrak{a}$ et $\alpha = \sum_{i=1}^m \alpha_i e^i \in \mathfrak{n}^*$ on a

$$\begin{aligned} \Phi_r^l(\hat{\sigma})(\phi, \alpha) &= \sum_{i_1, \dots, i_l=1}^m \text{trace}(\phi E_{i_{\sigma(1)}}^{i_1}) \dots \text{trace}(\phi E_{i_{\sigma(l-r)}}^{i_{l-r}}) \\ &\quad (\alpha E_{i_{\sigma(l-r+1)}}^{i_{l-r+1}}) \wedge \dots \wedge (\alpha E_{i_{\sigma(l)}}^{i_l}) \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_l=1}^m \phi_{i_{\sigma(1)}}^{i_1} \dots \phi_{i_{\sigma(l-r)}}^{i_{l-r}} \alpha_{i_{\sigma(l-r+1)}} \dots \alpha_{i_{\sigma(l)}} e^{i_{l-r+1}} \wedge \dots \wedge e^{i_l} \end{aligned}$$

Quand on regarde la décomposition en cycles de σ , alors on trouve des entiers positifs $1 \leq a_1 \leq \dots \leq a_p$ et $1 \leq b_1 \leq \dots \leq b_r$ tels que $l = a_1 + \dots + a_p + b_1 + \dots + b_r$ et

$$\Phi_r^l(\hat{\sigma})(\phi, \alpha) = \epsilon \text{trace}(\phi^{a_1}) \dots \text{trace}(\phi^{a_p}) (\alpha \phi^{b_1-1}) \wedge \dots \wedge (\alpha \phi^{b_r-1}) \quad (3.2)$$

où $\epsilon \in \{-1, 1\}$. Il est bien connu que les polynômes Casimir $\xi^1, \dots, \xi^m \in \mathcal{S}\mathfrak{a}$ définis par $\xi^a : \phi \mapsto \text{trace}(\phi^a)$ engendrent librement l'anneau commutatif des invariants $(\mathcal{S}\mathfrak{a})^{\mathfrak{a}}$, voir par exemple [8] : c.-à-d. $(\mathcal{S}\mathfrak{a})^{\mathfrak{a}}$ est isomorphe à l'anneau des polynômes en m variables $\mathbb{K}[\xi^1, \dots, \xi^m]$. Remarquons que ξ^a est de la forme $\xi^a = \Phi_r^l(\sum_{i_1, \dots, i_a=1}^m E_{i_2}^{i_1} \otimes \dots \otimes E_{i_a}^{i_{a-1}} \otimes E_{i_1}^{i_a})$.

Calculons $\delta \xi^a$ où δ désigne l'opérateur cobord de Chevalley-Eilenberg pour les cochaînes de $\mathfrak{n}$: on a

$$\begin{aligned} (\delta \xi^a)(v)(\phi, \alpha) &= -(v, \xi^a)(\phi, \alpha) = - \sum_{s=1}^a \text{trace}(\phi E_{i_2}^{i_1}) \dots \langle \alpha, E_{i_{s+1}}^{i_s} v \rangle \dots \text{trace}(\phi E_{i_1}^{i_a}) \\ &= - \sum_{s=1}^a \phi_{i_2}^{i_1} \dots \phi_{i_s}^{i_{s-1}} \langle \alpha, E_{i_{s+1}}^{i_s} v \rangle \phi_{i_{s+2}}^{i_{s+1}} \dots \phi_{i_1}^{i_a} = -a \langle \alpha, \phi^{a-1} v \rangle \end{aligned}$$

Puisque δ préserve les cochaînes $\mathfrak{a}$ -invariantes, alors $\delta \xi^a \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^1 \mathfrak{n}, \mathcal{S}^a \mathfrak{g})^{\mathfrak{a}}$. D'après l'équation (3.2) il s'ensuit que tout élément de $F \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^l \mathfrak{g})^{\mathfrak{a}}$ est de la forme

$$F = \sum_{a_1, \dots, a_r=1}^m F_{a_1 \dots a_r}(\xi^1, \dots, \xi^m) \delta \xi^{a_1} \wedge \dots \wedge \delta \xi^{a_r} \quad (3.3)$$

où $F^{a_1 \dots a_r}(\xi^1, \dots, \xi^m) \in \mathbb{K}[\xi^1, \dots, \xi^m]$. D'un autre coté, il est clair que tout élément de la forme (3.3) est une cochaîne $\mathfrak{a}$ -invariante de $\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda^r \mathfrak{n}, \mathcal{S}^l \mathfrak{g})$. Les $\delta \xi^a$ ($1 \leq a \leq m$) sont indépendants sur l'anneau $\mathbb{K}[\xi^1, \dots, \xi^m]$ car une équation $g_1 \delta \xi^1 + \dots + g_m \delta \xi^m = 0$ avec $g_1, \dots, g_m \in \mathbb{K}[\xi^1, \dots, \xi^m]$, évaluée sur $(\phi, \alpha, v) \in \mathfrak{a} \times \mathfrak{n}^* \times \mathfrak{n}$, impliquerait $g_1[\phi] \mathbf{1} + \dots + g_m[\phi] \phi^{m-1} = 0$ (où $g_a[\phi] := g_a(\text{trace}(\phi), \dots, \text{trace}(\phi^m))$),

donc $g_a[\phi] = 0$ pour la partie dense (au sens de Zariski) de $\mathfrak{a}$ de tous les $\phi \in \mathfrak{a}$ ayant des valeurs propres deux-à-deux différentes, alors $g_a = 0$ quel que soit $1 \leq a \leq m$. Puisque

$$\begin{aligned} \delta F &= \sum_{a_1, \dots, a_r=1}^m \delta(F_{a_1 \dots a_r}(\xi^1, \dots, \xi^m)) \wedge \delta \xi^{a_1} \wedge \dots \wedge \delta \xi^{a_r} \\ &= \sum_{a_1, \dots, a_r, a_{r+1}=1}^m \frac{\partial F_{a_1 \dots a_r}}{\partial \xi^{a_{r+1}}}(\xi^1, \dots, \xi^m) \delta \xi^{a_{r+1}} \wedge \delta \xi^{a_1} \wedge \dots \wedge \delta \xi^{a_r} \end{aligned}$$

on voit sans peine que le cocomplexe $(\mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\Lambda \mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{a}}, \delta)$ est isomorphe au cocomplexe de Koszul $(\mathbb{K}[\xi^1, \dots, \xi^m] \otimes \Lambda \mathfrak{n}^*, \delta_K)$ qui est acyclique (lemme de Poincaré algébrique), voir par exemple [20, p. 141]. Alors la cohomologie $\mathbf{H}_{CE}(\mathfrak{n}, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{a}}$ est isomorphe à $\mathbb{K}$, ce qui montre le premier énoncé du théorème.

D'après le théorème de Hochschild-Serre 2.2, appliqué à la sous-algèbre simple $\mathfrak{s} := \mathfrak{sl}(m, \mathbb{K})$ de $\mathfrak{a}$ on a $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{a}, \mathbb{K}) \cong \mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{s}, \mathbb{K}) \oplus \mathbf{H}_{CE}^1(\mathfrak{s}, \mathbb{K}) = \{0\}$ grâce aux lemmes de Whitehead. $\square$

Corollaire 3.3 *La somme directe d'une algèbre de Lie semi-simple $\mathfrak{s}$ de dimension finie et de l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^m$ est infinitésimalement fortement rigide.*

4 Propriétés des algèbres de Lie fortement rigides

4.1 Rigidité de l'algèbre de Lie

Théorème 4.1 *Si $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie, de dimension finie sur $\mathbb{K}$, fortement rigide, alors elle est rigide en tant qu'algèbre de Lie.*

Démonstration: On suppose que l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ de $\mathfrak{g}$ soit rigide, mais l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ ne soit pas rigide : alors il existerait une déformation formelle non triviale $(\mathfrak{g}[[t]], \mu_t)$ de $\mathfrak{g}$ avec $\mu_t = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n t^n$ telle que la classe de μ_1 soit non nulle dans $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})$. Puisque $\mathfrak{g}$ est de dimension finie, alors le $\mathbb{K}[[t]]$ -module $\mathfrak{g}[[t]]$ est isomorphe au module libre $\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]]$. Soit $e_1, \dots, e_n$ une base de $\mathfrak{g}$, $y_1, \dots, y_n$ les images des vecteurs de base dans $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ et $y'_1, \dots, y'_n$ les images des vecteurs de base dans $\mathcal{U}(\mathfrak{g}[[t]])$. On note $\bullet$ la multiplication dans $\mathcal{U}(\mathfrak{g}[[t]])$. Pour toute suite finie croissante $I = (i_1, \dots, i_k)$ d'indices dans $\{1, \dots, n\}$ posons $y_I := y_{i_1} \cdots y_{i_k}$ dans $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ et $y'_I := y'_{i_1} \bullet \cdots \bullet y'_{i_k}$ dans $\mathcal{U}(\mathfrak{g}[[t]])$. D'après le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt (qui s'applique à la situation où l'algèbre de Lie est un module libre sur un anneau commutatif, (voir [7, p.271])) les y_I forment une base de $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ sur $\mathbb{K}$ et les y'_I forment une base de $\mathcal{U}(\mathfrak{g}[[t]])$ sur $\mathbb{K}[[t]]$. On

voit que l'application $\Phi : \mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]] \rightarrow \mathcal{U}(\mathfrak{g}[[t]])$ définie par $\Phi(y_I) := y'_I$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}[[t]]$ -modules. Soit $\pi_t : \mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]] \times \mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]] \rightarrow \mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]]$ la multiplication sur le module $\mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]]$ induite par $\bullet$ et Φ , c.-à-d. $\pi_t(a, b) := \Phi^{-1}(\Phi(a) \bullet \Phi(b))$. La restriction de π_t aux éléments de $\mathcal{U}\mathfrak{g} \times \mathcal{U}\mathfrak{g}$ définit une application $\mathbb{K}$ -bilinéaire $\mathcal{U}\mathfrak{g} \times \mathcal{U}\mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]] \subset \mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]]$ que l'on note aussi par π_t , à savoir $\pi_t(u, v) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \pi_n(u, v)$ quels que soient $u, v \in \mathcal{U}\mathfrak{g}$ où $\pi_n \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes \mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g})$. L'associativité de π_t sur trois éléments $u, v, w \in \mathcal{U}\mathfrak{g}$ entraîne les équations $\sum_{s=0}^r \left(\pi_s(\pi_{r-s}(u, v), w) - \pi_s(u, \pi_{r-s}(v, w)) \right) = 0$ quel que soit $r \in \mathbb{N}$. Par conséquent, π_t définit une multiplication $\mathbb{K}[[t]]$ -bilinéaire associative sur le $\mathbb{K}[[t]]$ -module $\mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]]$ (qui contient $\mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]]$ comme sous-module dense par rapport à la topologie t -adique) de façon usuelle :

$$\pi_t \left(\sum_s^{\infty} t^s u_s, \sum_{s'=0}^{\infty} t^{s'} v_{s'} \right) := \sum_{r=0}^{\infty} t^r \sum_{\substack{s, s', s'' \geq 0 \\ s+s'+s''=r}} \pi_{s''}(u_s, v_{s'})$$

En particulier, l'application π_0 définit une multiplication associative sur l'espace vectoriel $\mathcal{U}\mathfrak{g}$, et $(\mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]], \pi_t)$ est une déformation formelle associative de $(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \pi_0)$. Pour toutes suites finies croissantes I, J on a $\pi_0(y_I, y_J) = \Phi^{-1}(y'_I \bullet y'_J)|_{t=0}$: en 'ordonnant bien' le produit $y'_I \bullet y'_J$ on obtient des combinaisons linéaires des y'_K où la suite finie croissante K est de longueur inférieure ou égale à la somme des longueurs de I et de J dont les coefficients ne contiennent que les constantes de structure du crochet μ_0 de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ car $t = 0$. Donc π_0 est égale à la multiplication de l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ et $(\mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]], \pi_t)$ est donc une déformation formelle associative de l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$. Il s'ensuit que π_1 est un 2-cocycle de Hochschild de $\mathcal{U}\mathfrak{g}$, et la restriction de π_1 sur $X, Y \in \mathfrak{g}$ vérifie

$$\mu_1(X, Y) = \pi_1(X, Y) - \pi_1(Y, X) \quad \forall X, Y \in \mathfrak{g}. \quad (4.1)$$

car l'algèbre de Lie $(\mathfrak{g}[[t]], \mu_t)$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathcal{U}(\mathfrak{g}[[t]])$ qui, d'après ce qui précède, peut être considérée comme une sous-algèbre associative de $(\mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]], \pi_t)$. La rigidité de $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ implique qu'il existe un isomorphisme formel $\varphi_t = \sum_{r=0}^{\infty} \varphi_r t^r$, avec $\varphi_0 = Id_{\mathcal{U}\mathfrak{g}}$ et $\varphi_n \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g})$ tel que

$$\varphi_t(\pi_t(u, v)) = \pi_t(\varphi_t(u), \varphi_t(v)), \quad \forall u, v \in \mathcal{U}\mathfrak{g},$$

ce qui est équivalent à

$$\sum_{r=0}^{\infty} t^r \sum_{\substack{a, b \geq 0 \\ a+b=r}} \varphi_a(\pi_b(u, v)) = \sum_{r=0}^{\infty} t^r \sum_{\substack{a, b, c \geq 0 \\ a+b+c=r}} \pi_a(\varphi_b(u), \varphi_c(v)) \quad \forall u, v \in \mathcal{U}\mathfrak{g}. \quad (4.2)$$

Pour $r = 1$, la relation précédente devient

$$\pi_1(u, v) = (\delta_H \varphi_1)(u, v) \quad \forall u, v \in \mathcal{U}\mathfrak{g} \quad (4.3)$$

où δ_H est l'opérateur cobord de Hochschild (voir [27]) par rapport à la multiplication π_0 de l'algèbre enveloppante.

Alors les formules (4.1) et (4.3) impliquent

$$\begin{aligned}\mu_1(X, Y) &= (\delta_H \varphi_1)(X, Y) - (\delta_H \varphi_1)(Y, X) \\ &= X\varphi_1(Y) - \varphi(XY) + \varphi(X)Y - Y\varphi_1(X) + \varphi(YX) - \varphi(Y)X \\ &= (\delta_{CE} \varphi_1)(X, Y) \quad \forall X, Y \in \mathfrak{g}\end{aligned}\tag{4.4}$$

où δ_{CE} est l'opérateur cobord de Chevalley-Eilenberg (voir [7]).

Par conséquent μ_1 est un cobord de Chevalley-Eilenberg et sa classe est nulle dans $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})$, d'où une contradiction. $\square$

Ce théorème permet de restreindre la recherche d'algèbres enveloppantes rigides aux seules algèbres de Lie rigides. Pour les propriétés et la classification des algèbres de Lie rigides, voir ([6], [4], [24], [1] et [25]).

4.2 Deuxième groupe de cohomologie scalaire

Dans ce paragraphe, on établit un critère cohomologique qui assure qu'une algèbre de Lie n'est pas fortement rigide. Soit $(\mathfrak{g}, [\ , \])$ une algèbre de Lie sur l'anneau commutatif K . Soit $\omega \in \mathbf{Z}_{CE}^2(\mathfrak{g}, K)$ un 2-cocycle scalaire de $\mathfrak{g}$. Soit $\mathfrak{g}_\omega = \mathfrak{g} \oplus Kc$ une extension centrale unidimensionnelle de $\mathfrak{g}$ par rapport à ω dont le crochet $[\ , \]'$ est défini de la façon usuelle par

$$[X + ac, Y + bc]' := [X, Y] + \omega(X, Y)c \quad \forall X, Y \in \mathfrak{g}; a, b \in K.\tag{4.5}$$

Théorème 4.2 *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie de dimension finie sur le corps $\mathbb{K}$ telle que son deuxième groupe de cohomologie scalaire $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathbb{K})$ soit non trivial. Alors, $\mathfrak{g}$ n'est pas fortement rigide.*

Démonstration: Soit $\omega \in \mathbf{Z}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathbb{K})$ un 2-cocycle de classe non nulle et soit $\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]]$ l'extension centrale unidimensionnelle de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}[[t]] = \mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]]$ sur $K = \mathbb{K}[[t]]$ par rapport à $t\omega$ (voir (4.5)). Dans l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]])$ de $\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]]$ on note la multiplication par $\bullet$ et on considère l'idéal bilatère $\mathcal{I} := (1 - c') \bullet \mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]]) = \mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]]) \bullet (1 - c')$ (où c' désigne l'image de c dans $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]])$) et l'algèbre quotient $\mathcal{U}_{t\omega} \mathfrak{g} := \mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]])/\mathcal{I}$. Soit $e_1, \dots, e_n$ une base de $\mathfrak{g}$ sur $\mathbb{K}$. Alors $c, e_1, \dots, e_n$ est une base de $\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]]$ sur $\mathbb{K}[[t]]$. Soient $y_1, \dots, y_n$ les images des vecteurs de base dans $\mathcal{U} \mathfrak{g}$ et $c', y'_1, \dots, y'_n$ les images des vecteurs de base dans $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]])$. Pour toute suite finie croissante $I = (i_1, \dots, i_k)$ d'indices dans $\{1, \dots, n\}$ posons $y_I := y_{i_1} \cdots y_{i_k}$ dans $\mathcal{U} \mathfrak{g}$ et $y'_I := y'_{i_1} \bullet \cdots \bullet y'_{i_k}$ dans $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]])$. D'après le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt (qui s'applique à la situation où l'algèbre de Lie est un module libre sur un anneau commutatif, (voir [7, pp. 271])) les y_I forment une base de $\mathcal{U} \mathfrak{g}$ sur $\mathbb{K}$, et les $c'^{\bullet i_0} \bullet y'_I$ (où $i_0 \in \mathbb{N}$ et $c'^{\bullet i_0} := 1$) forment une base de $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]])$ sur $\mathbb{K}[[t]]$. En passant à l'algèbre quotient $\mathcal{U}_{t\omega} \mathfrak{g}$,

on voit que $c'^{\bullet i_0}$ s'identifie à 1. En notant la multiplication dans $\mathcal{U}_{t\omega}\mathfrak{g}$ par $\cdot$ et les images de $y'_1, \dots, y'_n$ par la projection canonique par $y''_1, \dots, y''_n$, on voit que tout y'_I est envoyé sur $y''_I := y''_{i_1} \cdot \dots \cdot y''_{i_n}$. Il s'ensuit que tous les éléments y''_I forment une base de l'algèbre quotient $\mathcal{U}_{t\omega}\mathfrak{g}$. Comme dans la démonstration du théorème 4.1 précédent, l'application $\Phi : \mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]] \rightarrow \mathcal{U}_{t\omega}\mathfrak{g}$ donnée par $y_I \mapsto y''_I$ définit un isomorphisme de $\mathbb{K}[[t]]$ -modules libres. De façon complètement analogue à celle de la démonstration précédente on montre que la multiplication induite sur $\mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]]$ par la multiplication $\cdot$ de $\mathcal{U}_{t\omega}\mathfrak{g}$ et Φ définit une suite d'applications $\pi_t = \sum_{r=0}^{\infty} \pi_r t^r$, où $\pi_r \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes \mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g})$ avec les propriétés suivantes : (1.) π_t définit une déformation formelle associative de l'algèbre associative $(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \pi_0)$, c.-à-d. une multiplication $\mathbb{K}[[t]]$ -bilinéaire sur le $\mathbb{K}[[t]]$ -module $\mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]]$ (qui contient le $\mathbb{K}[[t]]$ -module $\mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]]$ comme sous-espace dense par rapport à la topologie t -adique), et (2.) π_0 est la multiplication usuelle de l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ de $\mathfrak{g}$. Par conséquent, π_1 est un 2-cocycle de Hochschild de $\mathcal{U}\mathfrak{g}$, et sur tous $X, Y \in \mathfrak{g} \subset \mathcal{U}\mathfrak{g}$ on a la relation : $\omega(X, Y)1 = \pi_1(X, Y) - \pi_1(Y, X)$ car l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}_{t\omega}[[t]]$ s'injecte dans l'algèbre quotient $\mathcal{U}_{t\omega}\mathfrak{g}$, et donc dans $\mathcal{U}\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[[t]] \subset \mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]]$.

Supposons que $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ soit rigide, donc en particulier, la déformation π_t est triviale. Alors il existe un 1-cocycle de Hochschild $\varphi_1 \in \mathbf{C}_H^1(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g})$ tel que $\pi_1 = \delta_H(\varphi_1)$. Par suite, il vient $\forall X, Y \in \mathfrak{g}$:

$$\omega(X, Y)1 = \pi_1(X, Y) - \pi_1(Y, X) = \delta_H(\varphi_1)(X, Y) - \delta_H(\varphi_1)(Y, X) = \delta_{CE}(\varphi_1)(X, Y).$$

On en déduit que ω est un cobord de Chevalley-Eilenberg et sa classe est nulle dans $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathbb{K})$, d'où la contradiction. $\square$

4.3 Quelques contre-exemples

Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie rigide, selon [4], elle se décompose sous la forme $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}$, où $\mathfrak{s}$ est une sous-algèbre de Levi, $\mathfrak{n}$ est le nilradical et $\mathfrak{t}$ est un tore (une sous-algèbre abélienne réductive) et telle que le radical de $\mathfrak{g}$ soit égal à $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}$ comme espace vectoriel.

On donne ci-après une liste d'algèbres de Lie satisfaisant le critère précédent.

Corollaire 4.1 *Les algèbres de Lie suivantes ne sont pas fortement rigides :*

1. *Toute algèbre de Lie nilpotente $\mathfrak{g}$ de dimension strictement supérieure à un.*
2. *Toute algèbre de Lie $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}$ dont le tore $\mathfrak{t}$ est de dimension supérieure ou égale à 2. En particulier, les sous-algèbres de Borel d'une algèbre de Lie semi-simple non isomorphe à $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{K})$ ne sont pas fortement rigides.*
3. *Les algèbres de Lie rigides qui sont des produits semi-directs de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{K})$ par les $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{K})$ -modules irréductibles $\mathbb{K}^n$ avec n pair.*

Démonstration: La première assertion est une conséquence d'un résultat classique de Dixmier concernant les algèbres de Lie nilpotentes ([14]) :

$$\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathbb{K}) \neq 0 \quad \text{si } \dim(\mathfrak{g}) \geq 2.$$

Pour (2) on applique le théorème de Hochschild–Serre et le fait que pour une sous-algèbre abélienne on ait $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{t}, \mathbb{K}) \neq \{0\}$.

(3) Les $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{K})$ -modules irréductibles $\mathbb{K}^n$ avec n pair possèdent une forme symplectique ω invariante par $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{K})$, par suite en appliquant le théorème de factorisation de Hochschild–Serre on a

$$\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathbb{K}) \simeq \mathbf{H}_{CE}^2(\mathbb{K}^n, \mathbb{K})^{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{K})} \neq \{0\}$$

puisque ce dernier contient ω . □

5 Quantification par déformation

Dans ce paragraphe, on rappelle la notion de star-produit associé à une structure de Poisson, ainsi que le théorème de Kontsevitch qui en assure l'existence. Le star-produit associé à la structure de Poisson linéaire d'une algèbre de Lie servira à déformer l'algèbre enveloppante, on parle dans ce cas de déformation par quantification.

5.1 Star-produits

Dans la théorie de quantification par déformation (voir [3]) on considère des déformations formelles particulières d'une algèbre associative et commutative :

Définition 5.1 *Soit $\mathcal{A} = \mathcal{C}^\infty(M)$ l'algèbre associative commutative des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à valeurs réelles ou complexes sur une variété M munie d'une structure de Poisson P . Le crochet de Poisson sur $\mathcal{A}$ qui en résulte est noté $\{ , \}$.*

Un $*$ -produit sur $\mathcal{A}$ est une déformation associative formelle de $\mathcal{A}$

$$f *_\lambda g = \sum_{r=0}^{\infty} \lambda^r B_r(f, g)$$

telle que :

1. *Le $*$ -produit plongé dans l'espace $\mathcal{A}[[\lambda]]$ des séries formelles en λ à coefficients dans $\mathcal{A}$ est associative, c'est à dire :*

$$\forall r \in \mathbb{N}, \quad \sum_{i=0}^r (B_i(B_{r-i}(f, g), h) - (B_i(f, B_{r-i}(g, h))) = 0.$$

2. $B_0(f, g) = fg$ (la multiplication point par point).
3. $B_1(f, g) - B_1(g, f) = \{f, g\}$ et $B_r(f, g) = (-1)^r B_r(g, f)$.
4. $B_r(f, 1) = B_r(1, f) = 0 \quad \forall r > 0$
5. Les B_r sont bilinéaires.

La condition 3 implique que $[f, g] := \frac{1}{2\lambda} (f *_{\lambda} g - g *_{\lambda} f)$ est une déformation de la structure de Lie $\{ , \}$.

5.2 La formule de Kontsevitch

Dans le domaine des star-produits, le résultat le plus spectaculaire fut donné par Kontsevitch en 1997, (voir [32]) :

Soit M une variété de Poisson. Soient $(x_1, \dots, x_n)$ des coordonnées locales sur M . On pose $\mathcal{A} = \mathcal{C}^\infty(M)$.

Soit $P = \frac{1}{2} \sum P^{a,b} \partial_a \wedge \partial_b$ (avec ∂_i la dérivée partielle $\frac{\partial}{\partial x_i}$, $i = a, b$) un bivecteur de Poisson sur M .

Théorème 5.1 (M.Kontsevitch 1997) *Il existe un star-produit sur toute variété de Poisson (M, P) .*

Pour la variété de Poisson $(\mathbb{R}^n, \frac{1}{2} \sum_{a,b=1}^n P^{ab} \partial_a \wedge \partial_b)$ Kontsevitch utilise l'Ansatz suivant pour l'opérateur bidifférentiel B_r du star-produit : soient $f, g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, $2r = n_1 + \dots + n_r + M + N$ une partition de l'entier positif $2r$ en somme d'entiers positifs et soit σ une permutation de $\{1, 2, \dots, 2r\}$. On note le couple $((n_1, \dots, n_r, M, N), \sigma)$ par Γ_r , et on définit l'opérateur bidifférentiel par

$$B_{\Gamma_r}(f, g) := \sum_{a_1, \dots, a_{2r}=1}^n \left(\frac{\partial^{n_1} P^{a_{\sigma(1)} a_{\sigma(2)}}}{\partial x_{a_1} \dots \partial x_{a_{n_1}}} \dots \frac{\partial^{n_r} P^{a_{\sigma(2r-1)} a_{\sigma(2r)}}}{\partial x_{a_{n_1}+\dots+n_{r-1}+1} \dots \partial x_{a_{n_1}+\dots+n_r}} \right. \\ \left. \frac{\partial^M f}{\partial x_{a_{n_1}+\dots+n_{r+1}} \dots \partial x_{a_{n_1}+\dots+n_r+M}} \frac{\partial^N g}{\partial x_{a_{n_1}+\dots+n_r+M+1} \dots \partial x_{a_{2r}}} \right). \quad (5.1)$$

L'opérateur B_r s'obtient comme une combinaison linéaire particulière d'opérateurs du type précédent paramétrée par tous les couples Γ_r possibles. Kontsevitch représente les Γ_r par des graphes à $r+2$ sommets (correspondant à r structures de Poisson et à deux fonctions) et $2r$ arrêtes (correspondant à $2r$ dérivées partielles) dans le demi-plan supérieur, et les coefficients w_{Γ_r} réels de la combinaison linéaire s'obtiennent par une intégration liée à l'image géométrique du graphe, (voir [32] ou [2] pour des détails). Dans le cas simple

où $\Gamma_r = (0, \dots, 0, M = r, N = r, \sigma)$, $\sigma(2k - 1) := k$, $\sigma(2k) = r + k$ quel que soit $1 \leq k \leq r$ le coefficient $w_{\Gamma_r} = \frac{1}{r!}$. Donc le star-produit de Kontsevitch $\star_K$ s'écrit de la manière suivante :

$$\star_K := \sum_{r=0}^{\infty} \lambda^r B_r := \sum_{r=0}^{\infty} \lambda^r \sum_{\Gamma_r} w_{\Gamma_r} B_{\Gamma_r}. \quad (5.2)$$

La formule de Kontsevitch s'étend facilement aux structures de Poisson complexes (qui sont des sections dans le fibré de bivecteurs complexifié), et on voit aisément que si $\mathbb{R}^{2n} \cong \mathbb{C}^n$ et f, g et P sont holomorphes, alors $f \star g$ sera holomorphe. De plus, si f, g et P sont des applications polynômiales complexes, alors il en est de même pour le star-produit de Kontsevitch $f \star g$. Finalement, si la structure de Poisson P elle-même est une série formelle $P = \sum_{s=0}^{\infty} t^s P_s$ où tous les P_s sont des champs de bivecteurs tels que $[P, P] = 0$, la formule de Kontsevitch donne une déformation de la variété de Poisson $(\mathbb{R}^n, P_0)$ à deux paramètres λ et t .

5.3 L'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ à la Kontsevitch

Soit $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$ une algèbre de Lie de dimension finie sur $\mathbb{C}$ et $\mathfrak{g}^*$ son dual algébrique. L'algèbre symétrique $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ est identifiée à l'algèbre des fonctions polynômes sur $\mathfrak{g}^*$. Soient $(e_i)_{i=1\dots n}$ une base de $\mathfrak{g}$, et $(e^i)_{i=1\dots n}$ sa base duale et $x = \sum_{i=1}^n x_i e^i \in \mathfrak{g}^*$. Soit $P_0 \in \mathcal{S}\mathfrak{g} \otimes \Lambda^2 \mathfrak{g}^*$ la structure de Poisson linéaire (2.16) provenant du crochet de Lie de $\mathfrak{g}$.

Il y a un star-produit $\star_G$ assez naturel sur $(\mathfrak{g}^*, P_0)$, dû à Simone Gutt [26] : pour tout $\xi \in \mathfrak{g}$ soit $e_\xi : \mathfrak{g}^* \rightarrow \mathbb{C}$ la fonction exponentielle $e_\xi(x) := e^{\langle x, \xi \rangle}$; et pour tous $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$ on définit :

$$e_\xi \star_G e_\eta := e_{H(\xi, \eta)} \quad (5.3)$$

où $H(\xi, \eta) \in \mathfrak{g}[[\lambda]]$ est la série de Baker-Campbell-Hausdorff,

$$\begin{aligned} H(\xi, \eta) &:= \xi + \eta \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n \geq 0 \\ l_1, \dots, l_n \geq 0 \\ k_i + l_i \geq 1}} \lambda^{\sum_{i=1}^n k_i + l_i} \frac{(ad(\xi))^{k_1} (ad(\eta))^{l_1} \dots (ad(\xi))^{k_n} (ad(\eta))^{l_n}}{(k_1 + \dots + k_n + 1) k_1! \dots k_n! l_1! \dots l_n!} \xi \end{aligned} \quad (5.4)$$

Ce star-produit a les propriétés suivantes :

Proposition 5.1 (S.Gutt 1983) *Quels que soient les polynômes f, g de $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ le star-produit $f \star_G g$ est un polynôme en λ et pour $\lambda = 1$ on a*

$$f \star_{G1} g := f \star_G g|_{\lambda=1} = \omega^{-1}(\omega(f)\omega(g))$$

où ω est l'isomorphisme linéaire de symétrisation entre $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ et $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ (2.2). En particulier, l'algèbre associative $(\mathcal{S}\mathfrak{g}, \star_{G1})$ est isomorphe à l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$.

Démonstration: La démonstration se déduit de la formule (4.2) dans [26], p.256. $\square$

Il s'avère que le star-produit de Gutt est en général différent de celui de Kontsevitch. G.Dito a fait la comparaison :

Proposition 5.2 (G.Dito 1999) *Soit $\star_K$ le star-produit de Kontsevitch (5.2) pour la variété de Poisson $(\mathfrak{g}^*, P_0)$.*

Alors $B_2(f, g) = B_2(g, f)$ quels que soient $f, g \in \mathcal{A}$ et

$$\xi \star_K \eta - \eta \star_K \xi = \lambda[\xi, \eta] \quad \forall \xi, \eta \in \mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}^{**} \subset \mathcal{A}. \quad (5.5)$$

En outre, il existe une équivalence ρ entre $\star_G$ et $\star_K$ (c.-à-d. $\rho(f \star_G g) = \rho(f) \star_K \rho(g) \quad \forall f, g \in \mathcal{A}$) qui est de la forme

$$\rho = \exp \left(\sum_{r \geq 2} \lambda^r a_r D_r \right) \quad (5.6)$$

où $a_r \in \mathbb{C}$ et D_r est un opérateur différentiel d'ordre r à coefficients constants qui contient r dérivées partielles.

Démonstration: Ces énoncés sont tous démontrés dans l'article de Dito [13]. $\square$

On a le corollaire suivant :

Corollaire 5.1 *Soient $f, g \in \mathcal{S}\mathfrak{g}$. Alors le star-produit $f \star_K g$ est un polynôme en λ et pour $\lambda = 1$ on obtient donc une multiplication associative $\star_{K1}$ sur $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ définie par*

$$f \star_{K1} g := (f \star_K g) |_{\lambda=1}. \quad (5.7)$$

L'algèbre associative $(\mathcal{S}\mathfrak{g}, \star_{K1})$ est isomorphe à l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ de $\mathfrak{g}$.

Démonstration: Soient δ_1 et δ_2 les degrés des polynômes f et g . L'opérateur bidifférentiel B_r contient r fois la structure de Poisson linéaire P_0 et $2r$ dérivées partielles. Donc il restent toujours au moins r dérivées qui sont distribuées sur f et g . Il s'ensuit que $B_r(f, g) = 0$ si $r > \delta_1 + \delta_2$, d'où la convergence du star-produit $\star_K$ sur les polynômes. On déduit de la formule (5.6) de Dito que l'opérateur différentiel ρ_r dans $\rho = \sum_{r=0}^{\infty} \lambda^r \rho_r$ contient exactement r dérivées partielles : alors ρ converge aussi sur tout polynôme f et définit ainsi une bijection $\mathbb{C}$ -linéaire $\rho_{(1)} : \mathcal{S}\mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{S}\mathfrak{g}$ par $\rho_{(1)}(f) := \rho(f) |_{\lambda=1}$. D'après la proposition 5.2 de Dito $\rho_{(1)}$ définit un isomorphisme d'algèbres associatives $(\mathcal{S}\mathfrak{g}, \star_{G1}) \rightarrow (\mathcal{S}\mathfrak{g}, \star_{K1})$. Alors $(\mathcal{S}\mathfrak{g}, \star_{K1})$ est isomorphe à l'algèbre enveloppante grâce à la proposition 5.1 de Gutt. $\square$

6 Déformations des algèbres enveloppantes par quantification

Dans ce paragraphe on va étudier les déformations de l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ d'une algèbre de Lie complexe $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$ qui s'obtiennent à l'aide d'une déformation polynômiale P_t de la structure de Poisson linéaire P_0 (2.16) sur l'algèbre symétrique $\mathcal{S}\mathfrak{g}$:

6.1 Le théorème

Théorème 6.1 *Soient $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$ une algèbre de Lie de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, $\mathfrak{g}^*$ son dual algébrique, $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ l'algèbre des fonctions polynômiales sur $\mathfrak{g}^*$, $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ l'algèbre enveloppante de $\mathfrak{g}$ et P_0 le champ de bivecteurs de la structure de Poisson linéaire (2.16) sur $\mathfrak{g}^*$.*

On suppose qu'il existe une suite $(P_a)_{a \in \mathbb{N}}$ de bivecteurs polynômiaux ($P_a \in \mathcal{S}\mathfrak{g} \otimes \wedge^2 \mathfrak{g}^*$) tels que tous les crochets de Schouten $\sum_{i+j=a} [P_i, P_j]_s = 0$ quels que soient $a \in \mathbb{N}$ et P_1 n'est pas cohomologue à 0.

Alors $P_t = \sum_{a \geq 0} t^a P_a$ est une déformation non triviale de la structure de Poisson P_0 et elle induit une déformation non triviale de l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ par la formule de Kontsevitch. En particulier, l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ n'est pas fortement rigide.

Démonstration: On considère la déformation $\hat{\star}_K$ de l'algèbre symétrique $\mathcal{S}\mathfrak{g}[[t]]$ induite par les formules de Kontsevitch (5.1) et (5.2) pour la structure de Poisson formelle P_t . Alors pour tout entier positif r , les opérateurs bidifférentiels de Kontsevitch (5.1) sont des séries formelles en t :

$$B_{\Gamma_r}(f, g) = \sum_{k \geq 0} t^k B_{k, \Gamma_r}$$

avec

$$B_{k, \Gamma_r}(f, g) := \sum_{\substack{b_1, \dots, b_r \geq 0 \\ b_1 + \dots + b_r = k}} \sum_{a_1, \dots, a_{2r} = 1}^n \left(\frac{\partial^{n_1} P_{b_1}^{a_{\sigma(1)} a_{\sigma(2)}}}{\partial x_{a_1} \cdots \partial x_{a_{n_1}}} \cdots \frac{\partial^{n_r} P_{b_r}^{a_{\sigma(2r-1)} a_{\sigma(2r)}}}{\partial x_{a_{n_1} + \dots + n_{r-1} + 1} \cdots \partial x_{a_{n_1} + \dots + n_r}} \right. \\ \left. \frac{\partial^M f}{\partial x_{a_{n_1} + \dots + n_r + 1} \cdots \partial x_{a_{n_1} + \dots + n_r + M}} \frac{\partial^N g}{\partial x_{a_{n_1} + \dots + n_r + M + 1} \cdots \partial x_{a_{2r}}} \right). \quad (6.1)$$

On pose $B_{r,k}(f, g) := \sum_{\Gamma_r} w_{\Gamma_r} B_{k, \Gamma_r}(f, g)$, et le star-produit de f et de g est de la forme suivante :

$$f \hat{\star}_K g = \sum_{r,k \geq 0} \lambda^r t^k B_{r,k}(f, g),$$

et induit donc une déformation à deux paramètres λ et t de l'algèbre symétrique $\mathcal{S}\mathfrak{g}$.

On va montrer que cette déformation est convergente en λ sur les polynômes : soient f et g deux polynômes dans $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ tels que f est homogène de degré δ_1 et g est homogène de degré δ_2 . On fixe r et k . Alors le coefficient en t^k de $B_{r,k}(f, g)$, $B_{k, \Gamma_r}(f, g)$ consiste en $r - k$ copies de la structure de Poisson linéaire P_0 et k copies des autres bivecteurs $P_{b_i} \in \mathcal{S}\mathfrak{g} \otimes \Lambda^2 \mathfrak{g}^*$ où $1 \leq b_i \leq k$ quel que soit b_i . Alors pour k fixé il n'y a qu'un nombre fini N_k des bivecteurs P_{b_i} pour lesquels $b_i \geq 1$. Soit d le maximum des degrés de P_0 et de ces autres bivecteurs. D'après la formule (6.1), le degré polynômial δ de $B_{k, \Gamma_r}(f, g)$ est majoré de la manière suivante :

$$\delta \leq (r - k)1 + dk + \delta_1 + \delta_2 - 2r = (d - 1)k + \delta_1 + \delta_2 - r$$

Par conséquent, $B_{k, \Gamma_r}(f, g) = 0$ si $r \geq (d - 1)k + \delta_1 + \delta_2 + 1$. Il s'ensuit que cette déformation est convergente en λ sur les polynômes f, g . On peut donc fixer $\lambda = 1$, et on obtient une multiplication associative $\hat{\star}_{K1}$ à un seul paramètre t sur $\mathcal{S}\mathfrak{g}[[t]]$. Pour $k = 0$, la formule (6.1) ne contient que la structure de Poisson linéaire P_0 : alors la multiplication $\hat{\star}_{K1}$ est une déformation formelle associative (en t) de la multiplication $\star_{K1}$ (voir (5.7)) sur $\mathcal{S}\mathfrak{g}$. Puisque l'algèbre associative complexe $(\mathcal{S}\mathfrak{g}, \star_{K1})$ est isomorphe à l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$ d'après le corollaire 5.1, on a donc construit une déformation formelle associative $\mu_t = \sum_{r=0}^{\infty} t^r \mu_r$ de l'algèbre enveloppante $\mathcal{U}\mathfrak{g}$.

Supposons maintenant que μ_t soit triviale : alors il existerait une série $S_t := 1 + \sum_{r=1}^{\infty} t^r S_r$ où $S_r \in \mathbf{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathcal{U}\mathfrak{g}, \mathcal{U}\mathfrak{g})$ telle que $S_t(\mu_t(f, g)) = \mu_0(S_t(f), S_t(g))$ quels que soient $f, g \in \mathcal{U}\mathfrak{g}[[t]]$. En particulier, pour $r = 1$ et $f = \xi, g = \eta$ avec $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$ on aurait

$$\mu_1(\xi, \eta) = -S_1(\mu_0(\xi, \eta) + \mu_0(S_1(\xi), \eta) + \mu_0(\xi, S_1(\eta))),$$

alors, grâce à (5.5) :

$$\begin{aligned} \mu_1^-(\xi, \eta) &:= \mu_1(\xi, \eta) - \mu_1(\eta, \xi) \\ &= -S_1[\xi, \eta] + S_1(\xi) \star_{K1} \eta - \eta \star_{K1} S_1(\xi) - S_1(\eta) \star_{K1} \xi + \xi \star_{K1} S_1(\eta). \end{aligned}$$

Puisque la transformation d'équivalence de Dito (5.6) en $\lambda = 1$, $\rho_{(1)}$, donne $\rho_{(1)}(\xi) = \xi$ quel que soit $\xi \in \mathfrak{g}$ on obtient

$$\begin{aligned} \rho_{(1)}^{-1}(\mu_1^-(\xi, \eta)) &= -\rho_{(1)}^{-1}(S_1[\xi, \eta]) + \rho_{(1)}^{-1}(S_1(\xi)) \star_{G1} \eta - \eta \star_{K1} \rho_{(1)}^{-1}(S_1(\xi)) \\ &\quad - \rho_{(1)}^{-1}(S_1(\eta)) \star_{K1} \xi + \xi \star_{K1} \rho_{(1)}^{-1}(S_1(\eta)) \\ &= -\rho_{(1)}^{-1}(S_1[\xi, \eta]) + [\rho_{(1)}^{-1}(S_1(\xi)), \eta] - [\rho_{(1)}^{-1}(S_1(\eta)), \xi] \\ &= (\delta_{CE}(\rho_{(1)}^{-1} \circ S_1))(\xi, \eta) \end{aligned}$$

car le star-produit de Gutt $\star_{G_1}$ est isomorphe à la multiplication associative sur $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ obtenue à l'aide de l'isomorphisme ω (2.2) qui est un morphisme de $\mathfrak{g}$ -modules. Le terme μ_1 est une somme d'opérateurs bidifférentiels du type $B_{k,\Gamma_{r+1}}(\xi, \eta)$ (6.1) avec $k = 1$. Cet opérateur contient r fois la structure de Poisson linéaire P_0 et une fois le champs de bivecteurs P_1 . Si ϵ est le degré maximal de $\mu_1|_{\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}}$, alors le degré de $B_{k,\Gamma_{r+1}}(\xi, \eta)$ est inférieur ou égal à $\epsilon - r$, donc il est maximal pour $r = 0$. Dans ce cas, la composante de degré ϵ de $B_{k,\Gamma_{r+1}}(\xi, \eta)$ est proportionnelle à $P_1(\xi, \eta)$ avec un poids non nul. En considérant la composante de degré ϵ dans l'équation précédente et en notant que $\rho_{(1)}$ ne change pas la composante du plus haut degré, on voit que P_1 est un 2-cobord de la cohomologie de Chevalley-Eilenberg, contrairement à l'hypothèse. Alors la déformation de l'algèbre enveloppante est non triviale. $\square$

Remarque 6.1 *Les deux théorèmes 4.1 et 4.2 peuvent se déduire également du théorème 6.1.*

6.2 Applications

On montre que les algèbres de Lie rigides $\mathfrak{t}_1 \oplus \mathfrak{n}_{5,6}$ et $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{n}_3$ ne sont pas fortement rigides en appliquant le théorème 6.1.

6.2.1 Algèbre de Lie résoluble $\mathfrak{t}_1 \oplus \mathfrak{n}_{5,6}$

On considère l'algèbre de Lie résoluble rigide $\mathfrak{t}_1 \oplus \mathfrak{n}_{5,6}$ de dimension 6, définie relativement à la base $\{X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ par

$$[X_0, X_i] = iX_i \quad i = 1, \dots, 5 \quad (6.2)$$

$$[X_1, X_i] = X_{i+1} \quad i = 2, 3, 4 \quad (6.3)$$

$$[X_2, X_3] = X_5 \quad (6.4)$$

les autres crochets étant nuls ou déduits des précédents par antisymétrie.

Proposition 6.1 *Soit $P \in \mathcal{S}\mathfrak{g} \otimes \wedge^2 \mathfrak{g}^*$ défini par $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\})$:*

$$\begin{aligned} P_1 = & \beta X_2^2 \frac{\partial}{\partial X_1} \wedge \frac{\partial}{\partial X_3} \\ & + \gamma (-X_2 X_3 \frac{\partial}{\partial X_1} \wedge \frac{\partial}{\partial X_4} + X_2 X_5 \frac{\partial}{\partial X_3} \wedge \frac{\partial}{\partial X_4}) + \alpha X_1 X_5 \frac{\partial}{\partial X_2} \wedge \frac{\partial}{\partial X_4} \end{aligned} \quad (6.5)$$

Alors $[P, P]_s = 0 = [P_0, P]_s$ et P n'est pas cohomologue à 0. En particulier $\mathfrak{g}$ n'est pas fortement rigide.

Démonstration: Un calcul direct montre que $[P, P]_s = 0 = [P_0, P]_s$.

Soit $\mathcal{S}_2\mathfrak{g}$ l'espace des polynômes quadratiques (de degré 2) de variables $X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$. On détermine l'espace des 2-cochaines quadratiques $\mathcal{S}^2\mathfrak{g} \otimes \wedge^2\mathfrak{g}^*$ et l'espace des 1-cochaines quadratiques $\mathcal{S}^2\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g}^*$. On montre qu'il n'existe aucun élément A de $\mathcal{S}^2\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g}^*$ tel que $d_{CE}A = P$. Alors $\mathfrak{g}$ n'est pas fortement rigide d'après le théorème 6.1. $\square$

6.2.2 Produit semi-direct de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ par $\mathfrak{n}_3$

On considère l'algèbre de Lie parfaite rigide $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{n}_3$ produit semi-direct de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ par $\mathfrak{n}_3$, l'algèbre de Heisenberg.

Soient h, e, f la base de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ et p, q, z la base de l'algèbre de Heisenberg $\mathfrak{n}_3$ vérifiant les relations suivantes :

$$\begin{aligned} [h, e] &= 2e, & [h, f] &= -2f, & [e, f] &= h, \\ [q, p] &= z, & [h, q] &= q, & [h, p] &= -p, \\ [e, p] &= q, & [f, q] &= p \end{aligned}$$

les autres crochets étant nuls ou déduits des précédents par antisymétrie.

L'action induite de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ sur $\mathfrak{n}_3^*$ à l'aide de la base duale p^*, q^*, z^* de p, q, z :

$$h \cdot q^* = -q^*, \quad h \cdot p^* = p^*, \quad e \cdot q^* = -p^*, \quad f \cdot p^* = -q^*$$

les autres actions étant nulles. En appliquant le théorème de factorisation de Hochschild-Serre on a :

$$\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{g}, \mathcal{S}\mathfrak{g}) \simeq \mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{n}_3, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})}$$

Lemme 6.1 Soit $\Phi \in \mathcal{S}\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g}^*$ (1-cocycle) avec $\Phi = g_1q^* + g_2q^* + g_3z^*$, et $g_i \in \mathcal{S}\mathfrak{g}$ on a

$$\delta_{CE}(z^*) = -q^* \wedge p^* \tag{6.6}$$

$$\delta_{CE}(\Phi) = ([q, g_2] - [p, g_1] - g_3) \cdot q^* \wedge p^* + [q, g_3] \cdot q^* \wedge z^* + [p, g_3] \cdot p^* \wedge z^* \tag{6.7}$$

Lemme 6.2 Le sous-espace vectoriel $\mathbf{F}$ de $\mathcal{S}^2\mathfrak{g}$ défini par

$$\mathbf{F} = \{g_3 \in \mathcal{S}^2\mathfrak{g} : [q, g_3] = [p, g_3] = 0\}$$

est engendré par $z^2, q^2 - 2ez, pq + hz$, et $p^2 + 2fz$. On a $\mathbf{F} \subset \mathcal{S}_{\mathfrak{n}_3}$ avec $\mathcal{S}_{\mathfrak{n}_3}$ l'idéal de $\mathcal{S}\mathfrak{g}$ engendré par $\mathfrak{n}_3$.

Proposition 6.2 *Soit $P \in \mathcal{S}\mathfrak{g} \otimes \wedge^2 \mathfrak{n}_3^*$ défini par*

$$P := C \, q^* \wedge p^* \text{ avec } C := h^2 + 4ef.$$

C est l'élément de Casimir quadratique de $\mathcal{S}\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.

Alors P est $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ -invariant, $[P, P] = 0 = [P_0, P]$ et P n'est pas cohomologue à 0 dans $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{n}_3, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})}$. En particulier, $\mathfrak{g}$ n'est pas fortement rigide.

Démonstration: On vérifie facilement que P est $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ -invariant, et $[P, P] = 0 = [P_0, P]$. On suppose qu'il existe un $\Phi = g_1 q^* + g_2 q^* + g_3 z^* \in \mathcal{S}^2 \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g}^*$ tel que $d_{CE}(\Phi) = ([q, g_2] - [p, g_1] - g_3) \, q^* \wedge p^* + [q, g_3] \, q^* \wedge z^* + [p, g_3] \, p^* \wedge z^* = C \, q^* \wedge p^*$ d'après le lemme 6.1. Puisque $q^* \wedge p^*, q^* \wedge z^*, p^* \wedge z^*$ forment une base de $\wedge^2 \mathfrak{n}_3^*$, on a $g_3 \in \mathbf{F} \subset \mathcal{S}_{\mathfrak{n}}$ d'après le lemme 6.2. Or $[q, g_2], [p, g_1] \in \mathcal{S}_{\mathfrak{n}}$ et par suite $C = ([q, g_2] - [p, g_1] - g_3) \in \mathcal{S}_{\mathfrak{n}}$, d'où une contradiction.

Alors P n'est pas cohomologue à 0 dans $\mathbf{H}_{CE}^2(\mathfrak{n}_3, \mathcal{S}\mathfrak{g})^{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})}$ et $\mathfrak{g}$ n'est pas fortement rigide d'après le théorème 6.1. $\square$

6.3 Classification des algèbres fortement rigides de dimension inférieure à six

On utilise la classification des algèbres de Lie rigides de dimension inférieure à sept, donnée par Carles et Diakité [5] [6] et les résultats précédents pour classer les algèbres de Lie fortement rigides.

Théorème 6.2 *Toute algèbre de Lie fortement rigide de dimension $n \leq 6$ est isomorphe à l'une des algèbres de Lie suivantes :*

$$\{0\}, \quad \mathbb{K}, \quad \mathfrak{r}_2, \quad \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}), \quad \mathfrak{gl}(2, \mathbb{K}), \quad \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}) \times \mathfrak{r}_2, \\ \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}) \times \mathfrak{sl}(2, \mathbb{K}), \quad \mathfrak{gl}(2, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^2.$$

7 Linéarisation des structures de Poisson

Ce problème a été posé par Weinstein [42, pp. 537] : Etant donné une variété de Poisson (M, P) dont la structure de Poisson P s'annule en un point $x_0 \in M$, il s'agit de voir si il existe un difféomorphisme ($\mathcal{C}^\infty$ ou formel) tel que P soit isomorphe à sa partie d'ordre 1 en x_0 , P_0 (voir [9], [10], [43], [18] et [35] pour des résultats dans ce domaine). D'un point de vue formel c.à.d. quand on remplace P par sa série de Taylor autour x_0 on ne considère que des déformations formelles de P_0 qui sont au moins quadratiques. La linéarisabilité de l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(m, \mathbb{K}) \times \mathbb{K}^m$ qui est fortement rigide, voir le théorème 3.3, a été obtenue à l'aide d'une démonstration géométrique par Dufour et Zung, voir [19].

Du théorème 6.1, on déduit le résultat suivant :

Théorème 7.1 *Toute structure de Poisson dont la partie linéaire correspond à une algèbre de Lie fortement rigide est formellement linéarisable.*

La réciproque de ce théorème n'est pas vraie en général : pour l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ somme semi-directe $\mathbb{K} \times \mathbb{K}^2$, où la sous-algèbre $\mathbb{K}$ agit sur le nilradical abélien $\mathbb{K}^2$ par des multiples de l'identité, on a que le deuxième groupe de cohomologie $H_{CE}^2(\mathfrak{g}, \bigoplus_{i=0, i \neq 1}^{\infty} \mathcal{S}^i \mathfrak{g})$ s'annule, alors elle est linéarisable (voir [18]), mais $\mathfrak{g}$ n'est pas rigide en tant qu'algèbre de Lie, car on peut aisément remplacer l'action de $\mathbb{K}$ sur $\mathbb{K}^2$ par une autre action linéaire. Donc $\mathfrak{g}$ n'est pas fortement rigide.

Remarque 7.1 *La structure de Poisson $P_0 + P_1$ définie dans (6.5) de la proposition 6.1 n'est pas formellement linéarisable parce qu'elle admet P_1 comme déformation quadratique non triviale.*

Références

- [1] J. M. ANCOCHEA BERMÚDEZ, M. GOZE : *Algèbres de Lie rigides dont le nilradical est filiforme*. Notes aux C.R.A.Sc. Paris, **312** (1991), 21-24.
- [2] D. ARNAL, D. MANCHON, M. MASMOUDI : *Choix des signes pour la formalité de Kontsevitch*. Prépublication Universités de Metz et de Nancy, [math.QA/0003003](#), 2000.
- [3] F. BAYEN, M. FLATO, C. FRØNSDAL, A. LICHNEROWICZ, D. STERNHEIMER : *Deformation theory and quantization I/ II*, Ann. Phys. **111** (1978), 61-110, 111-151.
- [4] R. CARLES : *Sur la structure des algèbres de Lie rigides*, Ann. Inst. Fourier **34** (1984), 65-82.
- [5] R. CARLES : *Weight systems for complex Lie algebras*. Preprint Université de Poitiers, **96** (1996).
- [6] R. CARLES, Y. DIAKITÉ : *Sur les variétés d'algèbres de Lie de dimension 7*. J. of Alg. **91** (1984), 53-63.
- [7] H. CARTAN, S. EILENBERG : *Homological algebra*. Princeton University Press, 1946.
- [8] C. CHEVALLEY : *Invariants of finite groups generated by reflections*. Am. J. Math. **77** (1955), 778-782.
- [9] J. F. CONN : *Normal Forms for Analytic Poisson Structures*. Ann. Math. **119** (1984), 577-601.
- [10] J. F. CONN : *Normal Forms for Smooth Poisson Structures*. Ann. Math. **121** (1985), 565-593.

- [11] M. DEWILDE, P. B. A. LECOMTE : *Existence of star-products and of formal deformations of the Poisson Lie Algebra of arbitrary symplectic manifolds*. Lett. Math. Phys. **7** (1983), 487-49.
- [12] J.A.DIEUDONNÉ, J.B.CARELL : *Invariant Theory, Old and New*. Academic Press, New York-London, 1971.
- [13] G. DITO : *Kontsevitch star-product on the dual of a Lie algebra*. math.QA/9905080, 12 mai 1999.
- [14] J. DIXMIER : *Cohomologie des algèbres de Lie nilpotentes*, Acta Sci. Math. **16**, Nos.3-4 (1955), 246-250.
- [15] J. DIXMIER : *Algèbres enveloppantes*, Gauthier-Villars, Paris, 1974, version anglaise : *Enveloping algebras*, GSM AMS, 1996.
- [16] V. G. DRINFEL'D : *Hopf algebras and the quantum Yang-Baxter equation*, Dokl. Akad. Nauk SSSR, **283** (1985), 1060-1064. or, Soviet math. Dokl., **32** (1985), 254-258.
- [17] V. G. DRINFEL'D : *Quantum Groups*. Dans : *Proc. Int. Cong. Math. (Berkeley 1986)*, 798-820, AMS, Providence, R.I. 1987.
- [18] J. P. DUFOUR : *Linéarisation de certaines structures de Poisson*. J. Differential Geometry **32** (1990), 415-428.
- [19] J.-P. DUFOUR, NGUYEN TIEN ZUNG : *Nondegeneracy of the Lie algebra $aff(n)$* , prépublication math.SG/020803.
- [20] B. V. FEDOSOV : *Deformation Quantization and Index Theory*. Akademie Verlag, Berlin, 1996.
- [21] M. GERSTENHABER : *On the deformation of rings and algèbras II*, Ann. of Math., **79** (1964), 59-103 .
- [22] M. GERSTENHABER : *The cohomology structure of an associative ring*. Ann.of Math. **78** (1963), 267-288 .
- [23] M. GERSTENHABER, S. D. SHACK : *Relative Hochschild cohomology, rigid algebras, and the Bockstein*, J. of Pure and Appl. Alg. **43** (1986), 53-74.
- [24] M. GOZE AND J. ANCOCHEA-BERMEDEZ : *On the classification of rigid Lie algebra*. J. Algebra. **245** (2001), 68-91.
- [25] M. GOZE AND E. REMM : *Valued deformations of algebras*. ArXiv :math.RA/0210475, 2002.
- [26] S. GUTT : *An explicit $*$ -product on the cotangent bundle of a Lie group*. Lett. Math. Phys. **7** (1983), 249-258.
- [27] G. HOCHSCHILD : *On the cohomology groups of an associative algebra*. Ann. Math. **46** (1945), 58-87.

- [28] G. HOCHSCHILD, J-P. SERRE : *Cohomology of Lie algebras*, Ann. Math. **57** (1953), 72-144.
- [29] M. JIMBO : *A q -difference analogue of $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ and the Yang-Baxter equation*. Lett. Math. Phys. **10** (1985), 63-69.
- [30] C. KASSEL : *Quantum Groups*. Graduate Texts in Mathematics, vol. **155**, Springer-Verlag, New York, 1995.
- [31] I. KOLÁŘ, P. MICHOR, J. SLOVÁK : *Natural Operations in Differential Geometry*. Springer, Berlin, 1993.
- [32] M. KONTSEVITCH : *Deformation quantization of Poisson manifolds*, arXiv :q-alg/9709040, 1997.
- [33] P.B.A. LECOMTE : *Application of the Cohomology of Graded Lie Algebras to Formal Deformation of Lie Algebras*. Lett. Math. Phys. **13** (1987), 157-166.
- [34] A. MAKHLOUF, M. GOZE, : *Classification of rigid associative algebras in low dimensions*, dans : *Lois d'algèbres et variétés algébriques* (ed. M. GOZE) Hermann, Collection travaux en cours **50**, 1996.
- [35] P. MONNIER, NGUYEN TIEN ZUNG : *Levi decomposition for smooth Poisson structures*, Prépublication math.DG/0209004
- [36] A. NIJENHUIS, R. W. RICHARDSON : *Cohomology and deformations in graded Lie Algebras*, Bull. Amer. Math. Soc. **72**, 1, (1966), 1-29.
- [37] T. PETIT : *Sur les algèbres enveloppantes des algèbres de Lie rigides*, thèse de doctorat, Université de Haute Alsace, (Novembre 2001).
- [38] M. PENKAVA, P. VANHAECKE : *Deformation quantization of polynomial Poisson algebras*, J. of Algebra, **227** (2000), 365-393.
- [39] G. RAUCH : *Effacement et déformation*. Ann.Ins.Fourier **22** (1972), 239-269.
- [40] R. W. RICHARDSON : *On the rigidity of semi-direct products of Lie algebras*. Pacific J. of Math. **22** (1967), 339-344.
- [41] I. VAISMAN : *Lectures on the geometry of Poisson manifolds*, Birkhäuser, Basel 1994.
- [42] A. WEINSTEIN : *The local structure of Poisson manifolds*, J. of Differential Geometry **18** (1983), 523-557.
- [43] A. WEINSTEIN : *Poisson Geometry of the Principal Series and Nonlinearizable Structures* J. of Differential Geometry **25** (1987), 55-73.